

الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

إعداد

دكتور محمد محمد محمد هاشم

أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة



دارالمعارف

تصميم الغلاف : محمد أبو طالب

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع

مقدمة

إن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان تكمن أسبابها من الحيوان ومنتجاته، وقد ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وهذا التزايد يرجع إلى ازدياد استهلاك الأغذية في المنتجات الحيوانية شبه الجاهزة (المطبوخة بشكل أولي)، في المطاعم والمقاصف، وأيضاً إلى ازدياد استيراد الحيوانات من مختلف دول العالم، فكانت الفكرة من إصدار هذا الكتاب هو التوعية بانتشار بعض الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان ومعرفة أسبابها ومصدر العدوى وطرق انتقال هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها لكل من المستهلك والصانع والعامل في حقل التغذية، وحيث إن هذا الكتاب وضع بأسلوب سهل ميسر لإبراز الأنواع المختلفة من الأمراض مثل الأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية والركتسيا وأمراض أخرى وذلك حتى يمكن الاستفادة منها لكل من المستهلك والقارئ العادي وكذلك الباحث وأيضاً المهتمين بمجال المواد الغذائية، وحتى تكون مجمعة مع بعضها وهذا يعطى سهولة في الحصول على المعلومات المطلوبة في أقصر وقت ممكن وأسهل وأيسر الطرق مما يقلل عناء الباحث وضياع الوقت لدى المهتمين.

وسوف نشرح بالتفصيل جميع الأمراض ونتبعها بملخص واف عن هذه الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في المنطقة العربية.

ولا شك أن تعريف المستهلك والباحث والمهتمين بالأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان يعتبر من الموضوعات الحيوية الهامة التي توضح الدور الهام الذي تقوم به هيئات التقييس في عالمنا العربي والإسلامي.

ومن منطلق اهتمام الهيئات العالمية بنشر الوعي الصحي بالغذاء الخالي من مسببات الأمراض. فقد قمنا بهذا العمل الذي أظهرنا فيه مدى ارتباط الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته بالإنسان.

ويتضح أهمية هذا الكتاب العلمى فى إبراز بعض الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان من الحيوان ومنتجاته ولسد العجز الكبير فى المكتبة العربية التى تحتاج إلى تدعيم كثير فى هذا المجال.

وبعد فلا يمكن لأى إنسان أن يبلغ الكمال التام فى إنجاز أى عمل، ولهذا وبرحابة صدر نتقبل من زملائنا والمتخصصين أى انتقاد موضوعى أو إضافة أو تعليق حول محتويات هذا الكتاب لكى نستفيد منها فى الطباعات القادمة.

وإذا كنا نقدم هذا الجهد المتواضع حول هذا الموضوع فإننا نعترف بأنه جهد عقلى، ونعتذر عما فيه من تقصير بعد ما بذلنا فيه ما فى وسعنا من جهد حتى صار على النحو الذى نرجو أن يحظى برضاء الساعين إلى المعرفة الطالبين لها مكانا عليا فى دنيا الناس.

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تفضل بأى مساهمة فى إصدار هذا الكتاب وظهوره بالمظهر اللائق.

ونرجو أن يكون ذو فائدة للعاملين فى هذا الميدان وخالصة لوجه الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يحقق لهذا العمل النجاح المنشود بفضل الله تعالى ثم بفضل إيمان المسئولين لإظهار خطورة الأمراض التى تصيب الإنسان من الحيوان ومنتجاته.

والله ولى التوفيق

(المؤلف)

الباب الأول

الأمراض البكتيرية

مرض السل

Tuberculosis

هو مرض مزمن أو حاد يصيب قنوات الجهاز التنفسي وخاصة الرئة وكذلك بعض أجزاء أخرى من أجهزة الجسم مثل الجهاز الليمفاوي والتناسلي والعصبي للإنسان ويتميز المرض بهدم الأنسجة الطبيعية ويحل محلها درنات.

أسباب العدوى هي :

١ - الجرثومة العصوية لميكروب السل My Cobacterium Tuberculosis

٢ - الجرثومة العصوية لميكروب السل البقري My Cobacterium bovis

٣ - الجرثومة العصوية لميكروب سل الطيور My Cobacterium avium

١- مرض السل البقري

مصدر العدوى وطريقة نقلها للإنسان :

- ١ - تناول اللبن الخام غير المغلى جيدا من الأبقار المريضة.
- ٢ - تناول منتجات الألبان مثل الزبد والقشدة والجبن الناتجة من حيوانات حاملة للميكروب.
- ٣ - تناول اللحوم ومنتجاتها من الحيوانات المصابة.
- ٤ - استنشاق الهواء الملوث بإفرازات الحيوانات أو الإنسان المصاب بمرض السل البقري وانتشارها أثناء الكح والعطس على هيئة رذاذ والتي يمكن استنشاقها مباشرة أو بعد سكونها واختلاطها بالتراب وتنشق كمعلق ترابي.
- ٥ - خلال الجلد بالحقن المباشر للجلد وعادة ما تكون عند الجزائريين والفاحصين للحوم وهو مرض مهني حيث تتعرض أيديهم غير المحمية من الذبائح الموجود بها مرض السل.

العوامل التى تؤثر فى القابلية للعدوى بالسل :

١ - العمر والجنس :

الأطفال الصغار لهم القابلية إلى حد كبير بالعدوى قبل عامين من العمر، ويظهر المرض بشكل حاد ما بين ٥ - ١٥ عاما من العمر وحالات قليلة تموت بسببه وتكون العدوى كبيرة فى سن البلوغ عند الإناث.

٢ - السلالات (الجنس) :

بعض السلالات لها قابلية للعدوى بالسل عن الأخرى مثل سلالات السود والهنود لهم قابلية للعدوى بمرض السل عن الجنس الأبيض، واليهود أقل سلالة تصاب بالعدوى لتعاقب الأجيال المصابة بالمرض والتى أدت إلى وجود مناعة عندهم ضد هذا المرض.

٣ - الحالة الاقتصادية:

السل عادة هو مرض الفقراء والذين هم تحت حد التغذية وذلك بسبب ضعفهم فى مقاومة المرض وأيضاً لأنهم يوجدون فى أماكن مزدوجة مما يساعد على انتشار المرض بينهم.

٤ - المهنة أو الحرفة :

الأفراد الذين يعملون فى صناعة المعادن وقطع الأحجار، مما ينتج عنه أتربة تحتوى على السلكا، تكون قابليتهم أكثر لمرض السل، وكذلك الأفراد العاملون فى حقن الطب والطب البيطرى معرضون أكثر من غيرهم من الناس للعدوى.

٥ - سوء التغذية

وهو ما يسبب اضطراباً فى بناء البروتوبلازم للخلايا الحية وكذلك يسبب اضطراب فى تأمين الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية والتى تعوض الخلايا عن المندثر منها ويكون الأفراد المصابون بمرض السكرى والذين يعانون من

الإجهاد المستمر والزائد عن الحد وكذلك الإناث نتيجة إجهاد الولادة هم من الأفراد الأكثر تعرضا لهذا المرض.

فترة الحضانة للمرض :

تعتمد فترة العدوى بالمرض على عدد الميكروب العصوى للسل الموجود في إفرازات حامل العدوى والعادات الصحية للمريض وفترة علاج بميكروب السل. وفترة العدوى تستمر طالما هناك إفرازات بها ميكروب السل والتي تأتي من الفرد الحامل له وتبدأ العدوى عندما يفتح الجزء المصاب ويستمر حتى يعافى منه المريض أو يموت ويستمر البصاق إيجابيا ومعديا لسنوات طويلة.

أنواع العدوى في الإنسان :

نوع العدوى يختلف تبعا لطريقة العدوى :

١ - السل الرئوى

هذا المرض يتكون في الرئة والغدة الليمفاوية للقصبة الهوائية وشعبها وتظهر الأعراض على هيئة كحة مصحوبة ببصاق صديد وظهور بصاق مدمم في الحالات الأولى ودرجة حرارة المريض ترتفع بعد الظهر وفي الليل يظهر على المريض عرق أحيانا وفي الحالات المتقدمة يشعر المريض بألم شديد في الصدر والتهاب في الغشاء البلورى وفقدان في الوزن.

٢ - سل خارج الرئة :

ويكون في الفم واللوزتين الموجودتين في الحلق وهى ما تسبب تضخما في الغدة الليمفاوية في الرقبة وتأتى العدوى عادة نتيجة أكل الإنسان للغدد الليمفاوية أو العظم المصاب بالعدوى، وإذا اخترق الميكروب الغشاء المخاطي للأمعاء ظهرت أعراض السل على جدار الأمعاء وقد يكون أو لا يكون مصاحباً للإلتهاب البريتونى.

٣ - سل الجلد :

يسبب تقرحات فى الجلد مصحوبة بلون أصفر أو بنى للجلد، ويوجد تضخم فى الغدة الليمفاوية فى الجزء المصاب.

طرق التحكم فى انتشار المرض :

أولا : الإجراءات الوقائية

- ١ - تعريف الناس بخطورة مرض السل وطرق انتشاره والتحكم فى انتشاره.
- ٢ - عزل وعلاج الحالات النشطة المصابة بمرض السل والكشف بالأشعة على المشتبه فيهم وعلى المرضعات وطلاب الطب والجزارين ومفتشى اللحوم وبائعى الألبان وأفراد المدارس والذين يعملون فى المطاعم.
- ٣ - يجب أن تكون المشرفات من الممرضات غير مصابة بالسل.
- ٤ - عزل الأبقار الحلوب التى تعطى نتائج إيجابية مع اختبار السل والتأكد من عدم وجود ميكروب السل فى اللبن بعد تعقيمه.
- ٥ - عدم استنشاق السليكون من الأتربة فى المصانع قدر المستطاع.
- ٦ - تحصين الأفراد غير المصابين بلقاح خاص بميكروب السل (BCG).

ثانيا : التحكم فى الحالات المرضية الفردية والمتصلين بالمرضى والمحيطين بهم بما يأتى :

- ١ - تقرير عن الوضع الصحى لهم.
- ٢ - عزل المصابين فى مصحات لعلاجهم وإزالة بؤرة العدوى من المنزل وتعليم المرضى النواحي الصحية اللازمة فى التحكم فى هذا المرض وهذا يسرع من شفائهم.
- ٣ - تطهير المعدات والمناديل والملابس وأوانى الطعام التى تستخدم بواسطة المريض وتعويد المريض على تغطية فمه وأنفه عند الكحة والعطس.

٤ - العلاج خاص بواسطة مجموعات من استريبتومييسين وثنائي أمين حامض السلسليك أو ايزو نيازيد، ريفاميسين وإيثامبيوتال.

ثالثا : التحكم فى انتشار المرض بشكل وبائى :

تقام أبحاث مكثفة عن مصدر العدوى بإجراء الآتى :

١ - عمل كشف اختبار السل على الحيوانات.

٢ - عمل كشف اختبار السل على الإنسان.

رابعا : التحكم العالى فى انتشار المرض :

١ - يجب عمل أشعة إكس للحالات الفردية قبل انتشار المرض.

٢ - يجب على كل إنسان عمل شهادة صحية فردية بعمل كشف السل عليه للتأكد من عدم وجوده.

٣ - يجلى عمل اختبار السل على كل الحيوانات المستوردة.

خامسا : تأمين وسلامة العاملين فى المختبرات

١ - العاملون فى المختبر لابد من ارتدائهم الملابس البيضاء التى تطهر قبل الغسيل ولابد من تغييرها أسبوعيا إذا كانت ملوثة بعترات ميكروب السل أو البصاق الموجود به الميكروب ويجب خلع هذه الملابس قبل تناول الأكل والشرب.

٢ - ممنوع منعا باتا وضع طعام أو شراب فى ثلاجة المختبر.

٣ - ممنوع لمس الأعين والقم والأنف قبل تنظيف الأيدي.

٤ - أنابيب الطرد المركزى تمسك من النصف بعيدا عن فتحها بالأصابع وإذا انكسرت فى جهاز الطرد المركزى يزال الجزء المعدنى ويطهر.

٥ - بعد نهاية العمل اليومى بالمختبر تقتل الحشرات وتطهر تراكيبات المختبر.

٢ - سل الطيور

سل الطيور وجد فى الأجهزة الداخلية للإنسان

مصدر العدوى

- ١ - البيض من الدجاج المصاب بالسل
- ٢ - أعضاء الدجاج المصابة بالميكروب
- ٣ - فى لبن الأبقار والماعز المصابة بسل الطيور
- ٤ - الخضراوات التى تستخدم فى السلطة وملوثة ببراز الدجاج المصاب بالمرض والذى يستخدم فى التسميد
- ٥ - استنشاق الأتربة الملوثة ببراز الدجاج المصاب بالسل
- ٦ - الحيوانات الحاملة للميكروب مثل الطيور والأرانب

طريقة التحكم فى المرض

- ١ - يعمل اختبار السل فى الدجاج فى الجزء المتدلى من رأسها وإعدام الحاملة للمرض
- ٢ - غلى البيض ٦ دقائق على الأقل
- ٣ - تطهير الخضراوات المستخدمة فى السلطة بماء جار أو باستخدام ١٪ من سائل برمنجنات البوتاسيوم
- ٤ - بسترة اللبن المنتج من البقر والماعز المصابة بسل الطيور
- ٥ - القضاء على الذباب والتى تنقل العدوى

مرض البروسيلا

Brucellosis

تعريف :

مرض البروسيلا يسمى بالحمى المالطية أو حمى البحر المتوسط أو الحمى المتوجة وتكون البروسيلا في المقام الأول مرض حيوانات المزرعة والحيوانات المنزلية ويمكن أن ينتقل المرض مباشرة إلى الإنسان ويسبب تسهما دمويًا له وللحيوان ويمكن أن يظهر المرض بصورة حادة أو تحت الحادة أو المزمنة وتظهرها على الإنسان في الحالة الحادة تتميز بحمى غير منتظمة ورعشة وعرق وألم في العضلات والمفاصل لعدة أسابيع أو شهور. ونسبة معدلات الوفاة منه حوالي ٢ - ٥٪.

أسباب العدوى للإنسان :

- ١ - ميكروب بروسيللا ميليتنسيس (موجود في الفصيلة الماعزية *Brucella melitensis*) وهي المسبب الأعظم للمرض في الإنسان.
- ٢ - ميكروب بروسيللا أبورتس (موجود في الفصيلة البقرية *Brucella abortus*).
- ٣ - ميكروب بروسيللا سويس (موجود في الفصيلة الخنزيرية *Brucella Suis*).

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - لحم ودم وبول وبراز وحليب والمشيمة والإفرازات المهبلية والأجنة المجهضة من الحيوانات الحاملة للميكروب.
- ٢ - الحيوانات المريضة من الماعز والغنم والبقر والخنزير والخيول والدجاج والكلاب والقطط.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - عن طريق الغذاء :

- (أ) شرب الحليب الخام أو أكل منتجات الألبان المجهزة من حليب خام من الحيوانات المصابة بالمرض. والبروسيليا أبورتس تعيش في الجبن لمدة ١٥ - ١٠٠ يوم، وفي الحليب لمدة ٢٤ ساعة في درجة حرارة ٢٥ س وفي القشدة لمدة ٦ أسابيع عند درجة حرارة ٤ س وفي الجيلاني لمدة ٣٠ يوما عند درجة حرارة صفر مئوي وفي الزبدة لمدة ١٢٤ يوما عند حرارة ٤ - ٨ س.
- (ب) التغذية على لحوم وأعضاء (الطحال والكبد) من الحيوانات المصابة بميكروب البروسيليا.
- (ج) أكل الخضراوات الخضراء المستخدمة في السلطة أو شرب المياه الملوثة بإفرازات الحيوانات المصابة بالمرض.

٢ - عن طريق الجلد والأغشية المخاطية :

- (أ) بالتلامس المباشر وغير المباشر للحيوانات المصابة بمرض البروسيليا.
- (ب) لمس الأجنة والمشيمة والبول من الحيوانات المصابة وتسبب ٦٠ - ٧٠٪ من الحالات المرضية في البيطريين والجزارين والفلاحين.
- (ج) استنشاق الأتربة الملوثة بالميكروب من إفرازات الحيوانات المصابة وكذلك من صوف الغنم وشعر الماعز الحاملة للميكروب وكذلك من السيارات الحاملة للحيوانات والعدوى تأتي من اختراق الميكروب للغشاء المخاطي للتجويف الفموي والعين والجهاز التنفسي والجلد المجروح.
- (د) العدوى تأتي عن طريق التلقيح العرضي بلقاح ميكروب البروسيليا أبورتس بالحقنة ويصيب العين مما يسبب أعراض مرض البروسيليا الحاد.

(هـ) العاملين بالمختبرات وتأتى العدوى للعاملين بالمختبرات عن طريق زراعة الميكروب على العترات الخاصة به بالصدفة أو عند حقن تجارب الحيوانات.

٣ - عن طريق إنسان لآخر :

نادرا ما تحدث وتأتى بعد نقل دم من إنسان مصاب بالمرض إلى آخر أو للجنين من أمه .

العوامل التى تؤثر فى القابلية للعدوى بالبروسيلة

١ - العمر والجنس :

العمر القابل للعدوى يقع ما بين ٦ - ٤٠ سنة ولكن أغلب الحالات الشخصية بالمرض هى الأطفال يقع عمرهم تحت السادسة ، والذكور أكثر إصابة من الإناث (بنسبة ٣ : ١) وذلك لأن معظم العاملين فى حقل إنتاج الألبان واللحوم من الذكور.

٢ - المهنة

هذا المرض غالبا ما يصيب البيطريين والجزارين والعاملين فى حقل الحليب ومنتجاته من الحيوانات المصابة بميكروب البروسيلة.

٣ - وقت الإصابة بالعدوى

الوقت السائد للإصابة بالعدوى هو فصل الصيف ويبلغ ذروته فى شهر يوليو وأغسطس.

فترة الحضانة للمرض :

تختلف فترة الحضانة للمرض وقد تكون من ٢ - ٣ يوم وعادة ما تكون من ١٤ - ٣٠ يوما وأحيانا تكون ثلاثة شهور.

أعراض المرض مع الإنسان

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة (٣٨ - ٣٩ س) في الليل وتختفي في النهار.
- ٢ - الشعور بالتعب.
- ٣ - الشعور بالرعدة وصداع وعرق الليل.
- ٤ - الحمى مصحوبة بألم في الظهر والأيدى والأرجل والمفاصل مع ظهور تضخم وتيبس فيها.
- ٥ - فقدان الشهية ونقص في الوزن وظهور النحافة.

طرق التحكم في انتشار المرض :

أولا : الإجراءات الوقائية البيطرية :

- (أ) الوقاية من التعرض لحيوانات المزرعة المصابة بالمرض وذلك بما يأتي :
- ١ - إحلال الحيوانات السليمة مكان المريضة بشرائها من مزارع خالية من المرض.
- ٢ - جميع الحيوانات المشتراه توضع في الحجر الصحي لمدة ٣٠ يوما وفي أثناء هذا الوقت تختبر الحيوانات مرتين باختبار البروسيلا.
- ٣ - ممنوع منعاً باتاً اختلاط الحيوانات المريضة مع الحيوانات السليمة.
- ٤ - جميع الحيوانات المجهضة تختبر من احتمال وجود العدوى بها وعزل الحيوانات المجهضة حتى ثبوت خلوها من البوسيلا.
- ٥ - اختبار الحيوانات من وقت لآخر من ٢ - ٣ مرة في السنة باختبارات خاصة لتحديد الحيوانات الحاملة للميكروب وعزلها.
- ٦ - اتباع الشروط الصحية للوقاية من هذا المرض.

٧ - نشر الوعي الصحى بين الناس وتعريفهم بكل ما يتعلق بالمرض حتى يمكن الوقاية منه.

(ب) كيفية التعامل مع القطعان المريضة من الحيوانات :

- ١ - تحديد مصدر العدوى.
- ٢ - معرفة وقت إجهاض الحيوانات وسببه.
- ٣ - عمل اختبارات دم لجميع حيوانات المزرعة لدراسة مدى انتشار العدوى.
- ٤ - عمل تقرير صحى منتظم للعاملين فى هذا الحقل لمنع إصابتهم بمرض المهنة نتيجة تعرضهم للعدوى.
- ٥ - التعرف على وجود المرض بطريقة سيرولوجية قبل أن تظهر الأعراض.
- ٦ - المزارع الموجود بها المرض يقفل عليها حتى ذبحها جميعا بالنظم اللازمة لذلك.
- ٧ - تحصين الحيوانات باللقاح الخاص بذلك تحت الإشراف الطبى البيطرى.

ثانيا : طرق وقاية الإنسان من البروسيل :

- ١ - حماية الإنسان من مرض البروسيل بالتشخيص المبكر للمرض وعلاجه.
- ٢ - طهى اللحوم جيدا قبل تناولها.
- ٣ - حفظ اللحوم بالتجفيف والتقديد والتدخين يقتل البروسيل.
- ٤ - غلى وتعقيم الحليب ومنتجاته تحت ظروف صحية سليمة قبل استعماله.
- ٥ - تحصين الإنسان بلقاح خاص بذلك.
- ٦ - علاج الحالات الحادة للإنسان بالمضادات الحيوية الخاصة وهى تتراسيكلين - جنتاميسين - ريفاميسين . . . الخ.

- ٧ - جميع الأفراد الذين يعملون فى المزارع المصابة بالبروسيلا يجب أن يرتدوا ملابس خاصة تحميهم من المرض (الأوفارول - بالطو أبيض - مريلة جلد - حذاء جلد برقبة طويلة - قفازات جلدية).
- ٨ - ملابس العمل لابد أن تطهر فى محلول صابون به ٣٪ فينول ثم بعد ذلك تغسل وبعد إتمام العمل تطهر اليدين فى محلول صابون به ٢ - ٣٪ فينول أو ١٪ ليزول ثم بعد ذلك تغسل بالماء والصابون.
- ٩ - يجب أن يكون البيطريون فى منتهى الحذر والدقة عند استعمال اللقاح الحى للميكروب.
- ١٠ - علاج الجروح التى تكون فى اليدين وعدم وضعها على العينين.

مرض الجمرة الخبيثة

Anthrax

تعريف :

هو مرض يصيب الحيوانات آكلات الأعشاب وعادة يوجد في الأمعاء. ويظهر في الإنسان على هيئة بثرات خبيثة في الجلد وأحيانا في الرئة ويسمى مرض فارز الصوف.

أسباب العدوى

الجرثومة العصوية لميكروب الجمرة الخبيثة *Bacillus anthracis*

مصدر العدوى للإنسان

- لحم ودم الحيوانات الميتة المصابة بالمرض.
- المنتجات الحيوانية الملوثة بالميكروب المسبب لمرض الجمرة الخبيثة مثل الشعر والصوف وجلود الحيوانات.
- مصدر العدوى للإنسان أيضا هو البقر والأغنام والماعز.

طرق نقل العدوى للإنسان

- ١ - التلامس المباشر مع الإفرازات والمنتجات الحيوانية الملوثة بميكروب الجمرة الخبيثة من خلال الجروح الموجودة بالجلد.
- ٢ - استنشاق جرثومة الجمرة الخبيثة الموجودة في الأتربة الموجودة على الصوف أو الشعر أو الجلود الجافة أو البراز الجاف للحيوانات المصابة.
- ٣ - يجوز نقل المرض إلى الإنسان من ذباب المنازل والذباب القارص ميكانيكيا.

٤ - تنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق الحشرات التى تتغذى على الحيوانات الميته المصابة بالمرض.

٥ - نقل المرض من إنسان إلى إنسان آخر نادرا.

٦ - ينتقل المرض إلى العاملين فى المختبرات عن طريق لمس الميكروب إلى جلودهم المجروحة عند زراعة الميكروب على العترات الخاصة به.

أنواع العدوى فى الإنسان

أنواع العدوى فى الإنسان تأتى تبعا للمهنة :

١ - النوع الزراعى (غير الصناعى) يصيب هذا النوع الفلاحين والبيطريين والجزارين والباثولوجيين بتلامسهم للحيوانات المصابة وهذا النوع يسبب البثرات الخبيثة فى الجلد.

٢ - النوع الصناعى وتأتى العدوى من صناعة المنتجات الحيوانية مثل الصوف والشعر والجلود وهذه تأخذ شكل البثرات الخبيثة فى الجلد ويوجد بالرئة مسببا إلتهابا شديدا بها ، وهذه العدوى تعتمد على طبيعة الصناعة ومعالجة المنتجات الحيوانية.

فترة الحضانة للمرض :

فترة الحضانة للمرض ٧ أيام ويكون عادة أقل من ٤ أيام وفى النوع الرئوى لا يزيد على يوم واحد وفى النوع الجلدى الفترة تكون يومين.

أعراض المرض فى الإنسان

(أ) البثرات الخبيثة الجلدية وتظهر فى ظهر رقبة العتالين والشيالين وعند الجزارين والباثولوجيين تظهر العدوى فى أيديهم وتظهر أيضا العدوى فى وجه الأفراد الذين يستعملون فرش حلاقة ملوثة بميكروب الجمرة الخبيثة ، والأعراض المبكرة هى الهرش فى مكان العدوى وظهور بثرة صغيرة محاطة باحمرار وتتحول إلى حويصلة بها سائل أصفر وسريعا ما تكبر وتتحول إلى

قشرة سوداء جافة وتنتشر العدوى سريعا إلى الغدد الليمفاوية القريبة ثم إلى الدم وتسبب تسمما فى الدم خلال ٥ - ٦ أيام.

(ب) مرض فارز الصوف (الرئوى) ويسبب التهابا شديدا فى القصبة الهوائية والرئتين كما يسبب انفجارا دمويا فى الرئة مع تضخم الغدد الليمفاوية الخاصة بهم وظهور حمى وصدمة عصبية ثم الموت فى معظم الحالات.

(ج) الجمرة الخبيثة للقناة الهضمية وتأتى من أكل لحوم الحيوانات المصابة بالمرض وتظهر أعراضها فى الالتهاب الشديد للأمعاء والمعدة وقئ وبراز مدمم.

طرق الوقاية من المرض :

(أ) الإجراءات الوقائية هى :

- ١ - تحصين الأفراد بلقاح خاص بالجمرة الخبيثة.
 - ٢ - تعليم الأفراد معلومات كافية عن الجمرة الخبيثة وطريقة الوقاية منها.
 - ٣ - عدم استنشاق الأتربة الموجودة فى المواد الخام من الأنسجة الحيوانية والصوف والشعر وتهوية المصانع.
 - ٤ - استخدام ملابس خاصة عند ملامسة المواد المستخدمة فى المصانع مثل جلد الحيوانات والصوف والشعر.
 - ٥ - استخدام المطهرات والتعقيم للشعر والصوف قبل الاستعمال ويستخدم فى هذا المجال جاما كوبلت المشع مع الصوف والشعر المستورد.
- تعقيم الشعر والصوف المستورد من المصادر الخطرة كآلاتى :
- ١ - المواد المستوردة السابق ذكرها توضع لمدة ١٠ دقائق فى محلول مخفف من الصودا عند درجة حرارة ٤٠ س لإزالة الألبومين الذى يحمى جرثومة الجمرة الخبيثة بين بكراتها.

- ٢ - بعد ذلك يعمل لها حمام لمدة ١٠ دقائق بمحلول صابون عند درجة حرارة ٤٠ س حتى تقتل جرثومة الجمرة الخبيثة.
- ٣ - ثم تمرر بعد ذلك مرتين فى حمامين : الأول يحتوى على ٢٪ محلول فورمالدهيد والثانى على ١,٩٨٪ من محلول فورمالدهيد عند درجة حرارة ٤٠ س كل خطوة تأخذ ٥ دقائق.
- ٤ - ثم بعد ذلك تغسل فى حمام بالماء النظيف عند درجة حرارة ٤٠ س لمدة ٥ دقائق لإزالة الفورمالدهيد الزائد ولا يجب أن يكون تركيز الفورمالدهيد أكثر من ٠,٢٥٪.
- ٥ - ثم بعد ذلك يجفف بهواء ساخن ثم يمرر عليه تيار من الهواء البارد ويأخذ حوالى ٩ دقائق.
- ٦ - يمكن تطهير المواد (الصوف - الشعر - الجلد) بواسطة الأتوكلاف ثم بعد ذلك تعرض لغاز الفورمالدهيد الدافىء بتركيز ٦٠٪.
- ٧ - تطهير أماكن العمل والمصانع الخاصة بالصوف والجلد والشعر.
- ٨ - يجب وجود جهاز تهوية فى هذه المصانع.
- ٩ - إخماد التربة الناتجة عن صناعة الصوف والشعر والجلد.
- ١٠ - وضع الحيوانات وأعلافهم بعيدا عن الحيوانات المصابة.
- ١١ - الكشف الباثولوجى على الحيوانات الميتة المشتبه فيهم مرض الجمرة الخبيثة وكما يجب العناية بعدم تلوث الأماكن الموجودة بها الحيوانات المصابة ويمكن عمل اختبار بكتريولوجى من الوريد الأذنى فى الحيوان.
- ١٢ - يجب أن تعدم الحيوانات الميتة الحاملة لميكروب الجمرة الخبيثة بحفر حفرة عمقها ٢ متر ويوضع عليها مسحوق الحجر الجيرى الحى. وهذا كاف لمنع انتشار الميكروب.
- ١٣ - التحصين ضد مرض الجمرة الخبيثة فى الأماكن الموبوءة كل ستة أشهر.

- ١٤ - عند ظهور الجمرة الخبيثة فى حيوان توضع باقى الحيوانات فى الحجر الصحى البيطرى لمدة أسبوعين بعد ظهور آخر حالة من المرض أو بعد أسبوعين من التحصين.
- ١٥ - علاج الحيوانات المصابة بالبنسلين أو تتراسيكلين ثم التحصين بعد العلاج.
- ١٦ - عزل المريض المشتبه فيه وعمل مزرعة بكتريولوجية والتأكد من عدم وجود ميكروب الجمرة الخبيثة.
- ١٧ - تطهير الأماكن والملابس والأدوات.
- ١٨ - علاج المرضى بالبنسلين أو التتراسيكلين أو بالمضادات الحيوية واسعة الطيف ثم التحصين باللقاح الخاص بذلك.
- (ب) الإجراءات الوقائية العالمية :
- ١ - تعقيم العظم المستورد لغذاء الحيوانات.
- ٢ - تطهير الصوف والشعر والجلود بالفورمالدهيد وبأكسيد الإيثيلين أو بالكوبالت المشع.

مرض الحارث Actinomycosis

تعريف :

هو مرض مزمن يتميز بوجود ورم حبيبي ملتهب مع تقيحات وجيوب مملوءة بإفرازات صديدية محتوية على حبيبات (حبيبات كبريتية أو وردية) وترى بالعين المجردة أو بعدسة يد وموجودة في التجويف الفمى.

أسباب العدوى للإنسان :

١ - الجرثومة العصوية ميكروب الحارث (يوجد فى مجموعات ناعمة Actinomyces bovis).

٢ - الجرثومة العصوية ميكروب الحارث الإسرائيلى (يوجد فى مجموعات خشنة Actinomyces israeli).

مصدر العدوى للإنسان :

١ - الخضراوات الملوثة بلعاب الحيوانات المريضة.

٢ - التجويف الفمى للإنسان والحيوانات التى تحتوى على ميكروب الحارث الموجود حول الأسنان المسوسة وفى اللوزتين.

٣ - الحيوانات المريضة بمرض الحارث: وهى البقر والغنم والخيول والخنزير.

طرق نقل العدوى للإنسان

١ - العدوى موجودة طبيعيا فى فم الإنسان نفسه حول الأسنان المسوسة والعدوى تنتقل إلى الإنسان من خلال الجروح الناتجة عن خلع الأسنان.

٢ - وجود أجسام غريبة فى المكان المتضرر فى الفم فتوجد فطريات ويسبب فى الفم عادة حالة مضغ تشبه صوت مضغ القش أو الحبوب أو الأعشاب.

٣ - لا توجد أى علامة على أن المرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال اللبن أو اللحم ولكن لوحظ أن الأفراد الذين يعملون فى مزارع الحيوانات يوجد بهم نسبة مرتفعة مصابة بالمرض.

٤ - سجلت بعض الحالات بأن العدوى تنتقل من إنسان لآخر.

أنواع المرض فى الإنسان وأنواعه

يوجد للمرض ثلاثة أنواع هى :

١ - نوع رقبى وجهى :

يوجد فى الرقبة والوجه والفك ويتميز بورم جاف ومتعدد الدماكل وبينهم جيوب لتصريف الإفرازات.

٢ - نوع صدرى :

وتوجد العدوى فى الرئة والتجويف الرئوى وهو نتيجة للنوع الرقبى ويحدث نتيجة سحب المواد المفزة من الفم إلى داخل الرئة وتكون عديدا من الجيوب فى جلد الصدر.

٣ - نوع بطنى :

وهو نتيجة النوع الرقبى ويحدث نتيجة بلع الإفرازات داخل المعدة وتوجد فى الزائدة الدودية والأمعاء الغليظة ويسبب مرض الزائدة الدودية الحاد أو تحت الحاد والعدوى تكون جيوبا فى جلد البطن.

طرق الوقاية للإنسان من المرض :

١ - الأبقار المصابة لا تذهب إلى المراعى حتى لا تلوث المراعى والخضراوات.

٢ - خلال الكشف عن اللحوم يعدم الجزء المصاب بالمرض.

٣ - يجب الاعتناء بالفم عند الإنسان وتحاشى الجروح بداخله.

٤ - تعريف الفرد بنوع المرض وطرق العدوى وكيفية الوقاية منه.

٥ - يجب على طبيب الأسنان تعقيم أدوات خلع الأسنان وخلافه حتى لا ينتقل المرض لشخص آخر.

٦ - العلاج الفورى بأستينو لايت والسلفا وكلورومييسين وكلوروتتراسيكلين وأحيانا يكون مصحوبا بعمل أشعة وجراحة كلما يتطلب الأمر ذلك.

مرض حمى الببغاء
أو مرض داء الببغاء
Avian Chlamydiosis
(Parrot Fever)

تعريف :

هو مرض سببه أقرب للبكتيريا عنه من الفيروس ويصيب الأفراد الذين يعملون في مزارع الطيور ويتميز بالإسهال والتهال.

سبب العدوى :

ميكروب حمى الببغاء Chlamydiosis psittaci.

مصدر العدوى وطريقة نقلها للإنسان :

- ١ - الطيور البرية والمنزلية ويعتبر البط والرومي المصدر الأساسي للعدوى.
- ٢ - استنشاق مسبب المرض من الدجاج.
- ٣ - يعتبر مرض مهني ينتقل للعاملين في مزارع الطيور بأنواعها.
- ٤ - نادرا أن ينتقل من إنسان لآخر (لوحظ أن ممرضة كانت ترعى مريضا مصابا بهذا المرض وانتقل إليها).

فترة حضانة المرض :

فترة حضانة المرض هي من ١ - ٢ أسبوع

أعراض المرض في الحيوان:

- ١ - ظهور حمى في الطيور.
- ٢ - إجهاض في الغنم والبقر.

٣ - التهاب الملتحمة فى العين وخاصة فى الخنزير.

٤ - يحدث التهاب رئوى فى القطط.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - يصيب الأفراد كبار السن.

٢ - تضخم فى الكبد والطحال.

٣ - قىء وإسهال ثم إمساك.

٤ - أرق وخمول ذهنى.

٥ - حمى ورعشة وصداع.

٦ - كحة جافة، ثم خروج بلغم صديدى والتهاب رئوى.

٧ - الخوف من الضوء.

طرق التحكم فى انتشار المرض :

(أ) وقاية الطيور المنزلية :

١ - منع دخول الطيور البرية على الطيور المنزلية.

٢ - تحسين مستوى إدارة المزارع.

٣ - العلاج السريع بالكلوروتتراسيكلين تركيز ٠.٠٥٠٪ فى الغذاء لمدة ٤٥ يوما قبل السفر أو بعد الوصول.

٤ - منع تربية الحمام بجوار مزارع الدواجن وحتى فى المدن.

(ب) طرق وقاية الإنسان :

١ - تعريف الإنسان بالمرض وكيفية الوقاية منه.

٢ - التشخيص الميكروبي وعزل المريض ووضعه فى المستشفى.

- ٣ - الأفراد العاملون بمزارع الطيور يجب أن يلبسوا كمادات لعدم استنشاق الميكروب ويجب تطهير ملابسهم وأيديهم بمركبات الأمونيوم.
- ٤ - عدم خروج المريض من المستشفى إلا بعد العلاج الكامل تماما.
- ٥ - أماكن العدوى والمرضى وملابسهم والأدوات المستخدمة ممن قبلهم تطهير بواسطة ٤٪ كلورامين، ٥٪ كلوريت، ٠.٥٪ هيدروكسيد الصوديوم، ٥٪ ليزول
- ٦ - يعالج الإنسان بالقتتراسيكلين.

مرض الرعام

Glanders

تعريف :

هو مرض منتشر فى الخيول والحمير والبغال نادرا ما يكون فى الإنسان وله نوعان يصيب الجلد ويسمى داء الخيل والنوع الثانى يصيب عموم الجسم ويسمى رعام والنوعان يظهران فى صورة حادة أو مزمنة والثانى يصيب الحيوانات أما الأول فيصيب الإنسان بصورة حادة.

سبب المرض :

الجرثومة العصوية لميكروب على (الرعام) *Actinobacillus mallei*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - من الإفرازات الناتجة من فتح الجزء المصاب من القناة التنفسية أو من الإفرازات الناتجة من جلد الحيوان أو الإنسان المصاب.
- ٢ - الخيول والحمير والبغال والجمال والقطط البرية وهذا المرض موجود فى حراس حديقة الحيوان وخاصة حراس النمور والأسود الذين يتغذون على لحوم الخيول المصابة بالمرض (الكلاب والقطط لديهم مقاومة شديدة للمرض).

خواص الميكروب :

الميكروب حساس للضوء والحرارة والجفاف ويمكن أن يعيش الميكروب فى الماء لمدة أسبوعين وعدة أيام فى روث الحيوانات وشهين فى الدم واللعاب ويتكسر الميكروب عند درجة حرارة ٥٥ س وكذلك بالمواد الكيميائية وماء الجير والكلورامين والفينول.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - عن طريق رزاز الإفرازات الأنفية أو الصدرية والتي تلامس الجروح فى الجلد والأغشية المخاطية أثناء الكحة أو العطس فى وجه الإنسان.

- ٢ - هذا مرض مهني ينتقل إلى الأفراد أو العاملين مع الخيول والفلاحين والجنود والجزارين والبيطريين للامستهم للحيوانات المريضة وكذلك للعاملين في المختبرات عن طريق لمسهم للمزارع الخاصة بالميكروب.
- ٣ - عن طريق بلع الميكروب المنتقل عن طريق اليد إلى الفم.
- ٤ - عن طريق استنشاق الرذاذ المحمل بالميكروب.
- ٥ - ينتقل المرض عن طريق إنسان لآخر.

فترة حضانة المرض :

فترة حضانة المرض من ١ - ٥ أيام.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - حمى - إجهاد - صداع.
- ٢ - شعور بالألم وظهور عقد تكبر في الجسم وتسبب فورانا بثرينا على جلد الوجه والأرجل والأيدى وأجزاء أخرى في الجسم.
- ٣ - إفرازات صديدية وأحيانا مدممة من الأنف ويصاحب ذلك تقرح في الحاجز الأنفي.
- ٤ - الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة والأرجل والأيدى متضخمة.
- ٥ - في المراحل الأخيرة من المرض يظهر تقيح دموى شديد وتنتشر البثرات على كل أجزاء الجسم وتظهر الدامل في العضلات والتهاب رئوى ثم الموت.
- طرق التحكم في انتشار المرض والوقاية :
- يعتمد عدم انتشار المرض في الإنسان على التحكم والوقاية منه في الخيول وذلك بما يأتي :
- ١ - أن يكون طعام وشراب الخيول خاليا من الميكروب.

- ٢ - عند ظهور مرض الرغامى فى الخيول تعزل ثم تعدم ويطهر مكانها
- ٣ - عدم لمس البثرات الموجودة على الخيول وكذلك الإفرازات الخارجة من الأنف والتي يوجد بها تقيح على الحاجز الأنفى.
- ٤ - العاملون بالمختبرات يجب أن يحتاطوا عند العمل على هذا الميكروب.
- ٥ - العاملون على علاج الأفراد المصابين يجب أن يظهروا ملابسهم وأيديهم وجميع الأدوات المستعملة من قبل المرضى بالتعقيم.
- ٦ - علاج المرضى بسلفاثيازول - كلورامفينيكول - أورايسين - تيراميسين.
- ٧ - الحيوانات المستوردة يعمل لها اختبار (مالين) وتعزل الحيوانات المصابة وتعدم.

مرض الضمرة Animal Erysipelas

تعريف :

مرض منتشر في الخنازير وينتقل إلى الإنسان عن طريق الجلد ولا ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي.

سبب المرض :

ميكروب السلاسل العقدية المكورة الدموى *Erysipelotrix insidiosa*.

خواص الميكروب :

يتكسر بالغلى فى الماء وخلال دقائق بسيطة بالمطهرات العادية.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - التربة والماء : الميكروب الموجود فى التربة والماء الملوث بالميكروب من النباتات المتعفنة.
- ٢ - من النباتات والحيوانات المتعفنة والمتحللة.
- ٣ - عن طريق الأسماك الموجود بها الميكروب من الطين والمواد المتعفنة والتي ترمى فى الماء الموجود بها السمك.
- ٤ - ذباب المنازل.
- ٥ - الحيوانات المصابة بالميكروب وهى السمك والغنم والدجاج والرومى والخنزير (الفئران والجرذان عن طريق لمس أغذية الإنسان).

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - يعتبر مرضا مهنيا وينتقل للعاملين بالمطابخ والجزارين والبيطريين والذين يلمسون الأسماك المريضة: وأيضا للعاملين فى المختبرات الذين يتعاملون مع الميكروب.

٢ - تناول الطعام وشرب الماء الملوّث بالميكروب من مختلف المصادر.

فترة حضانة المرض والأعراض فى الإنسان :

فترة حضانة المرض تأخذ من ١ - ٣ أيام. والأعراض ظهور التهاب جلدى فى اليدين والمفاصل والشفاف المبطن للقلب، وظهور تسمم دموى.

طرق الوقاية من المرض :

١ - تحصين الخنازير بلقاح ضد المرض.

٢ - نظافة وتطهير جميع الأدوات المستخدمة مع الخنزير.

٣ - يعزل الخنزير المعدى لمدة شهر قبل أن ينضم إلى القطيع السليم.

٤ - وقاية الإنسان من المرض تعتمد على :

(أ) تعريف الإنسان بالمرض وطرق الوقاية منه.

(ب) عن طريق الكشف الطبى للحوم

(ج) تخزين ونقل اللحوم والأسماك ومنتجاتها تحت الظروف الصحية السليمة.

(د) يجب أن تكون ظروف العمل فى المختبرات مناسبة.

(هـ) معالجة المرضى بالبهنسلين ووضع مرهم تيراميسين على الجزء المصاب.

مرض رغام القوارض Meliodosis or Rodent Glanders

تعريف :

مرض حاد وشبه حاد ومزمن ومعد لأتواع مختلفة من الحيوانات والإنسان، والنوع الحاد يميز المريض خلال أيام معدودة ويصاحب المريض حمى والتهاب رئوى والتهاب فى الجهاز الهضمى ثم الموت.

سبب العدوى :

ميكروب سودومونس سودومالى *Pseudomonas pseudomalli*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - المياه السطحية والتربة (الأراضى المزروع فيها الأرز).
- ٢ - الحيوانات الحاملة للميكروب مثل الماعز والغنم والخنازير والخيول والأبقار والكلاب والقطط والفئران البرية والوبر (خنزير عينية) والأرانب (دمامل فى الأحشاء والمفاصل والغدد الليمفاوية).
- ٣ - مصدر العدوى أيضا المياه والتربة الملوثة بإفرازات الدمامل المفتوحة.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- يعتقد أن الإنسان والحيوانات تكتسب العدوى بواسطة :
- ١ - ملامسة التربة أو الماء الملوث بميكروبات الجروح الموجودة فى الجلد.
 - ٢ - استنشاق الأتربة الموجودة بها الميكروب.
 - ٣ - ينتقل عن طريق براغيث الفئران والباعوض حيث إن الميكروب ينمو داخل الجهاز الهضمى لهم.

فترة الحضانة للمرض :

فترة الحضانة للمرض هي أيام قلائل ولكن أحيانا مسبب المرض يكون في حالة سكون لعدة شهور أو سنوات قبل أن تظهر الأعراض على الإنسان.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - التهاب في القصبة الهوائية.
- ٢ - التهاب رئوى.
- ٣ - تسمم دموى.
- ٤ - ارتفاع في درجة الحرارة.
- ٥ - ظهور تنكروز وورم حبيبي في الأماكن في الرئتين والغدد الليمفاوية والجلد والعظم. ويظهر في وسط التنكروز والورم الحبيبي مادة صديدية.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - يستخدم أحذية جلدية طويلة الرقبة في مزارع الأرز.
- ٢ - تغطية شبكة تصريف المياه.
- ٣ - علاج المرضى بالمضادات الحيوية.

مرض لستيرiosis

Listeriosis

تعريف :

هو مرض يسبب الإلتهاب السحائي الحاد يرافقه أو لا يرافقه تسمم دموى ويصيب مختلف أنواع الحيوانات والإنسان ويتميز هذا المرض بأعراض عصبية (التهاب الدماغ) ويزيد من كرات الدم البيضاء وخاصة المونوسيت ويظهر تنكزز فى القلب والكبد.

وجوده :

ينتشر المرض فى العالم ويصيب الإنسان والبقرة والرومى ومختلف أنواع الحيوانات البرية والطيور.

سبب العدوى :

ميكروب لستريا مونوسيتوجين *Listeria monocytogenes*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - الحليب الخام من الأبقار المصابة بالمرض.
- ٢ - الخضراوات الملوثة بروت الحيوانات المريضة.
- ٣ - الغنم والماعز والبقرة (إلتهاب الدماغ - تسمم دموى - إجهاض - إلتهاب الضرع) الخنازير (تسمم دموى) والكلاب (إلتهاب الدماغ) والأرانب والوبر والفئران (تسمم دموى) الدجاج وعصافير الكنارى (نسبة عالية من الموت).
- ٤ - الأجنة وولادات حديثة مصابة بالمرض.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - تنتقل العدوى للإنسان مباشرة إلى الفلاحين والبيطريين من الحيوانات المريضة وكذلك من الأجنة والمشيمة الحاملة للميكروب.

- ٢ - لمس إفرازات الحيوانات المريضة.
- ٣ - أكل اللحوم ومنتجاتها فى حالة التسمم الدموى وكذلك شرب الحليب الخام (الميكروب موجود فى زرع الحيوانات) الملوث بالميكروب والبيض عندما يشرح ويدخل فيه الميكروب الموجود فى براز الدجاج الملوث بالميكروب.
- ٤ - استنشاق الميكروب.
- ٥ - ينتقل المرض إلى الجهاز التناسلى عن طريق البراز وكما ينتقل المرض إلى الأجنة عن طريق الدم والمشيمة.
- ٦ - يمكن للعدوى أن تنتقل عن طريق الالتقاء الجنسى بين الرجل والمرأة.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - إلتهاب سحائى.
- ٢ - إجهاض النساء الحوامل وخاصة فى الجزء الثانى من الحمل.
- ٣ - ظهور تخلف عقلى فى الأطفال ويموت الطفل بعد ظهور التسمم بالميكروب.
- ٤ - إلتهاب القصبة الهوائية وكذلك الرئة وظهور تنكروز فى الكبد وتضخم فى الطحال.
- ٥ - ظهور العدوى فى الجلد على هيئة طفح وخاصة عند الأفراد الذين يقومون بتوليد الحيوانات.

طرق الوقاية من المرض :

- ١ - عزل الحيوان المريض وتطهير المبنى.
- ٢ - تعقيم الحليب أو غليه.
- ٣ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٤ - عدم الاقتراب من الحيوانات المريضة أو منتجاتها.

- ٥ - إعدام الطيور الموجودة بها العدوى.
- ٦ - يجب غلي البيض لمدة لا تقل عن ٦ دقائق.
- ٧ - علاج الحيوانات بمركبات السلفا والمضادات الحيوية.
- ٨ - علاج الأفراد بكلوروتتراسيكلين.

مرض الطاعون

Plague

تعريف :

هو مرض حاد ومعد ويوجد في الفئران والحيوانات الصغيرة والإنسان توجد به بالصدفة.

سبب العدوى :

الجرثومة العصوية لميكروب يرسينيا بستس *Yersinia pestis*.

العوامل التي تؤثر في القابلية للعدوى بالطاعون :

- ١ - مقدار قوة وحدة الجرثوم.
- ٢ - وجود الفئران البرية والحاملة للميكروب، حيث تلوث التربة ببرازها وإفرازاتها وحيث إن الميكروب له القدرة على الانقسام والعيش في التربة.
- ٣ - جميع الأعمار والأجناس قابلة للعدوى.
- ٤ - لا توجد مناعة طبيعية ضد المرض ولكن تظهر هذه المناعة ضد المرض في خلال ٧ أيام من العدوى.
- ٥ - تنقل الإنسان من مكان إلى آخر وهو حامل للبراغيث الحاملة للمرض فتنتشر من مكان إلى آخر.
- ٦ - وجود الفئران في البواخر والطائرات يمكن أن ينقل المرض عن طريق البراغيث الموجودة عليها من مكان إلى آخر أيضا.
- ٧ - الميكروب ينمو في درجة حرارة ٢٠ - ٣٥ س وهذا الجو مناسب لانتشار مرض الطاعون.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - البراغيث الحاملة للميكروب.

٢ - الفئران الحاملة للميكروب.

٣ - الهواء الملوث بالميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - عن طريق عض البراغيث الحاملة للميكروب للإنسان.

٢ - استنشاق الأتربة المحملة بالميكروب والقادمة من الإنسان المريض بالتهاب في الحلق نتيجة الميكروب.

أنواع العدوى في الإنسان:

١ - الطاعون الدبلي :

(يصيب الغدد الليمفاوية) ويصاحبه ألم وتضخم في الغدد الليمفاوية القريبة من عض البراغيث الحاملة للميكروب ويصحب ذلك ارتفاع في درجة الحرارة.

٢ - الطاعون الرئوي :

ويوجد في الرئة نتيجة استنشاق الهواء المحمل بالرداذ الموجود فيه الميكروب والنتيجة عنه إلتهاب في القصبة الهوائية والرئة ويسبب صداعا وغثيانا وكحة وتنخما (التخلص من البلغم) والبصاق مدمم ثم الموت خلال ٤ - ٥ أيام أو أقل من ذلك. وهذا المرض ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الرزاز من البصاق الموجود به الميكروب. يسود جسم المريض ويسمى (الموت الأسود).

٣ - الطاعون التسممي :

ويأتى من المواد المفزة بواسطة الميكروب ويسمى التوكسين (سم) ويسبب عند المريض حمى ونزف من الأنف وإسهال ثم الموت خلال ١٨ ساعة - ٣ أيام.

فترة العدوى :

يمكن أن تستمر العدوى في البراغيث لمدة شهر طالما أن الجو مناسب من درجة الحرارة والرطوبة.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الإنسان بالمرض وكيفية الوقاية منه.
- ٢ - قتل الفئران ودفنها بالطرق السليمة حتى لا ينتشر منها المرض وهذا يقلل من البراغيث الحاملة للميكروب.
- ٣ - استخدام المبيدات الحشرية فى قتل البراغيث.
- ٤ - رش المنازل بالمبيدات المناسبة لقتل البراغيث وحتى ٨ كيلو متر حول المكان.
- ٥ - التحصين ضد المرض باللقاح الخاص بذلك.
- ٦ - يجب ملاحظة الفرد المحصن لمدة ١٤ يوما بعد التحصين بجرعة تعزز المناعة.
- ٧ - يعزل المريض ويعطى المضاد الحيوى والسلفا المناسبة لمدة أسبوع وذلك فى مصحة.
- ٨ - تطهير كل الأدوات وملابس المريض.

الإجراءات الوقائية العالمية :

- ١ - يجب أن تبلغ الحكومات التى يظهر المرض فى بلادها، منظمة الصحة العالمية خلال ٢٤ ساعة.
- ٢ - عدم نقل الركاب بالطائرة أو الباخرة من الأماكن الموبوءة قبل ٦ أيام من ظهور المرض وملاحظتهم بعد وصولهم لمدة ٦ أيام أخرى.
- ٣ - منع وجود الفئران فى الطائرات والسفن حتى تمنع انتشار المرض بين الركاب عن طريق نقل العدوى لهم من البراغيث.
- ٤ - التحصين ضد مرض الطاعون.

مرض الحمى الناكسة Endemic Relapsing Fever

تعريف :

هو مرض يصيب الفئران وينتقل إلى الإنسان مباشرة من خلال عضه حشرة القراد الحاملة للميكروب.

سبب المرض :

ميكروب بوريا ريكورينتس *Borrelia recurrentis*.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - الحيوانات المصابة بحشرة القراد الحاملة للميكروب مثل الفئران والغنم والماعز.

٢ - بيوت الفئران.

فترة الحضانة :

فترة حضانة المرض في الإنسان ٧ أيام بعد عضه القراد الحاملة للميكروب وأحيانا من ٢ - ١٠ أيام.

أعراض المرض في الإنسان :

١ - ارتفاع درجة حرارته تصل إلى ٤١ س وتنتهي بعد ٣ - ٤ أيام وتظهر وتختفي فجأة.

٢ - رعشة وعرق وصداع وقئ.

٣ - ألم في العضلات مع وجود التهاب جلدي.

٤ - ظهور الصفراء.

٥ - نسبة الوفيات من هذا المرض ٢ - ٥ %.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تفادى عضة القراد الحامل للميكروب.
- ٢ - قتل الفئران والحشرات.
- ٣ - يستخدم مبيد حشرى مناسب للقضاء على القراد مثل ثنائى ميثيل فثاليت.

مرض حمى عضه الفأر

Rat Bite Fever

ينقسم إلى مريضين :

١ - مرض سودوكو Sodoku.

تعريف :

مرض ينتج عن عضه الفئران والحيوانات آكلة العشب الحاملة للميكروب، والميكروب موجود في اللعاب والغدد الليمفاوية والغشاء البريتوني وفي دم الإنسان والحيوان.

سبب المرض :

ميكروب سبيريليم مينس Spirillum minus.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة.
- ٢ - التهاب الأنسجة المحيطة بالجرح.
- ٣ - ألم في الغدد الليمفاوية القريبة من الجرح.
- ٤ - ألم في العضلات مع وجود تورعك.
- ٥ - ظهور بثرات حمراء على الأذرع والصدر.
- ٦ - ظهور أرتيكاريا.

طرق الوقاية للإنسان من المرض :

- ١ - حماية الأطفال من عضه الفئران.
- ٢ - تطهير الجروح.

٣ - علاج المرضى بمضادات حيوية مثل أورواميسين والبنسلين ومركبات الزرنينج.

٢ - مرض حمى هافرهيل Haverhill Fever.

تعريف :

هو مرض مصحوب بارتفاع فى درجة الحرارة ناتج عن غصة الفثران أو شرب لبن به الميكروب.

سبب المرض :

ميكروب استريت موريفيكانس *Strptobacillus morbificans*.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - الإفرازات من الجزء الأعلى للجهاز التنفسى فى الفثران المريضة.

٢ - إفرازات الأذن الوسطى والرئة فى الفثران المصابة بالميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - غصة الفثران الحاملة للميكروب وتظهر العدوى بعد ١٠ أيام من العض.

٢ - شرب حليب ومنتجاته ملوثة بالميكروب من الفثران المريضة.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - ارتفاع درجة حرارة الجسم وتستمر لمدة أسابيع أو لشهور للحالات غير المعالجة.

٢ - إحمرار العضلات وظهور بقع حمراء فى اليدين والأذرع والقدمين.

٣ - التهاب فى المفاصل.

٤ - تنكزز وتقرح فى مكان العدوى.

٥ - توجد دمامل تحت الجلد.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعقيم الحليب.
- ٢ - العلاج باستخدام المضادات الحيوية مثل البنسلين وتتراسيكلين.
- ٣ - استخدام المطهرات فى الجروح.
- ٤ - حماية تلوث الأغذية من الفئران.

مرض حمى هافرهيل Haverhill Fever

تعريف :

هو مرض مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة ناتج عن عضه الفئران أو شرب لبن به الميكروب.

سبب المرض :

ميكروب استربت موربيفيكانس *Strptobacillus moribificans*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - الإفرازات من الجزء الأعلى للجهاز التنفسي في الفئران المريضة.
- ٢ - إفرازات الأذن الوسطى والرئة في الفئران المصابة بالميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - عضه الفئران الحاملة للميكروب وتظهر العدوى بعد ١٠ أيام من العض.
- ٢ - شرب الحليب ومنتجاته الملوثة بالميكروب من الفئران المريضة.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - ارتفاع درجة حرارة الجسم وتستمر لمدة أسابيع أو لشهور للحالات غير المعالجة.
- ٢ - احمرار العضلات وظهور بقع حمراء في اليدين والأذرع والقدمين.
- ٣ - التهاب في المفاصل.
- ٤ - تنكزز وتقرح في مكان العدوى.
- ٥ - توجد دمامل تحت الجلد.

طرق الوقاية من المرض :

- ١ - تعقيم الحليب.
- ٢ - العلاج باستخدام المضادات الحيوية مثل البنسلين وتتراسيكلين.
- ٣ - استخدام المطهرات في الجروح.
- ٤ - حماية تلوث الأغذية من الفئران.

مرض ليبتوسبيروسيز

Leptospirosis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ومختلف أنواع الحيوانات المنزلية والبرية. وله عدة أسماء منها مرض ولز أو حمى الطين - حمى حقول الأرز أو حمى المستنقعات أو حمى الطوفان.

سبب العدوى للإنسان :

ميكروب ليبتوسبيروس Leptospirosis وهو عديد الأنواع.

مصدر العدوى للإنسان :

تعتبر الفئران أهم مصدر له وكذلك المجترات وآكلات الأعشاب والخنازير والخيول والجرذان والكلاب.

أعراض المرض في الحيوانات المختلفة :

- ١ - احتقان في الغشاء المخاطي وظهور اليرقان.
- ٢ - توجد تقرحات في اللسان واللثة ويحدث لون أحمر عند حدود اللثة عند لمسها.
- ٣ - الأسنان محاطة بطبقة من المخاط البني وظهور تنكز في اللسان.
- ٤ - قيء وإسهال وجفاف.
- ٥ - التهاب في الجهاز البولي والهضمي ونقص في البول.
- ٦ - التنفس ذو رائحة كريهة.
- ٧ - التهاب سحائي وعدم القدرة على الحركة.
- ٨ - العدوى في الكلاب تستمر (٢ - ٦) شهور.

- ٩ - يقلل إدرار اللبن ويكون لونه محمرا وبه تجلط.
- ١٠ - البول لونه أحمر مسود.
- ١١ - يسبب إجهاضا فى الحيوانات.
- ١٢ - يمكن عزل الميكروب من البول فى المختبرات من ٣٠ - ٦٠ يوما من العدوى.
- ١٣ - يمكن عزل الميكروب من الحليب بعد ٣ - ٤ أيام.
- ١٤ - وفى الماعز والغنم تستمر العدوى حوالى ٩ شهور.
- ١٥ - يسبب العمى القمري فى الخيول.
- الإنسان نادرا ما يكون حاملا للميكروب ويختفى من البول بعد ٤٠ يوما من العدوى وسجلت حالات نادرة بأنه يمكن عزل الميكروب من بول الإنسان حتى ٧٥ - ١٦٣ يوما ويستقر الميكروب فى الطحال والكبد والكلية.

فترة الحضانة للمرض فى الإنسان :

فترة الحضانة هى من ٩ - ١٠ أيام.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - نزيف برتقالى اللون.
- ٢ - إلتهاب سحائى.
- ٣ - التهاب كلوى.
- ٤ - التهاب كبدى.
- ٥ - أنيميا.
- ٦ - التهاب المخ.
- ٧ - يسبب العمى القمري.
- ٨ - إجهاض الحوامل.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - عن طريق تلوث التربة والطعام والماء ببول الحيوانات المريضة.
- ٢ - ماء حقول الأرز الملوثة بالميكروب.
- ٣ - ماء حقول قصب السكر الملوثة بالميكروب.
- ٤ - يوجد فى مزارع الحيوانات الحاملة للميكروب.
- ٥ - عن طريق العاملين فى مجال الأسماك الملوثة بالميكروب.
- ٦ - يصيب العاملين بالمختبرات بلمس القرنية أو الجلد المجروح والمخدوش بالميكروب.
- ٧ - شرب المياه الملوثة باستخدام المياه الملوثة ببول الحيوانات المريضة.
- ٨ - العدوى عن طريق الأكل نادرة وذلك لأن المعدة حامية تقتل الميكروب.
- ٩ - شرب حليب خام من حيوانات حاملة للميكروب فيخترق الميكروب الغشاء المخاطى ويستقر فى الأماكن المحيطة له مثل الطحال والكبد والكلى.
- ١٠ - تنتقل العدوى إلى الجزارين عند تقطيع الذبيحة الموجودة بها الميكروب.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - اتباع الطرق الصحية السليمة عند إزالة الفرش الموجود تحت أرجل الحيوانات المبللة والمحتوية على الميكروب.
- ٣ - منع تلوث المياه العامة مثل الآبار ببول الحيوانات.
- ٤ - حفظ الأغذية بعيدا عن الفئران.
- ٥ - شرب الماء بعد غليه أو وضع كلور بالنسبة المنصوص عليها صحيا.

- ٦ - استخدام مسيخات خاصة للتربة والتي تقتل الميكروب بها مثل سيانيد الكالسيوم.
- ٧ - الحفاظ على صحة العاملين المعرضين للميكروب باللبس الخاص مثل الحذاء ذى الرقبة الجلدية الطويلة والقفازات فى اليد.
- ٨ - حماية الجلد من الجروح والخدوش.
- ٩ - تحصين الأفراد بلقاح خاص بالميكروب.
- ١٠ - علاج المرضى بالمضادات الحيوية مثل بنسلين «ج» وأرثوميسين.

الوقاية البيطرية للحيوانات :

- ١ - تشخيص الحالة مبكرا.
- ٢ - عزل الحيوان المريض وعلاجه بالمضادات الحيوية.
- ٣ - وضع الحيوانات فى الحجر الصحى.
- ٤ - تحصين الحيوانات.
- ٥ - ذبح الحيوانات المريضة أو علاجها.

مرض حمى الأرانب

Tularemia

تعريف :

هو مرض يظهر فى الجزء الشمالى من الكرة الأرضية والبلاد الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وروسيا.

سبب العدوى :

ميكروب فرنسيسلا تولارنسيس Francisella Tularensis.

مصدر العدوى :

هو الفئران والقراد والأرانب البرية والغنم والأرانب الوحشية.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - تنتقل العدوى للإنسان عن طريق الملتحمة فى العين بواسطة الرذاذ الملوث بالميكروب أو بالأيدى الملوثة نتيجة لمس الحيوانات الحاملة للميكروب.
- ٢ - أكل لحوم غير مطهية جيدا وبها الميكروب.
- ٣ - عن طريق استنشاق الهواء الملوث برذاذ الحيوانات الحاملة للميكروب من صوفها أو بولها أو برازها.

فترة حضانة المرض فى الإنسان :

تأخذ فترة حضانة المرض فى الإنسان من ١ - ١٠ أيام.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - يظهر المرض أولا فى الأيدى والأصابع خلال يومين من العدوى على هيئة بثرات ويصحبها ألم فى الغدد الليمفاوية ثم يظهر بها تقرحات (بسبب ٨٥٪ من الحالات).

- ٢ - هذه البثرات يظهر فيها صديد ثم تقرح ويظهر عقد متصلة ببعضها بين الغدد الليمفاوية القريبة من مكان العدوى.
- ٣ - التهاب وتقرح الملتحمة بالعين وتضخم الغدد الليمفاوية القريبة من العين (تسبب ٦٪ من الحالات).
- ٤ - التهاب الغدد الليمفاوية المجاورة لمنطقة الحقن بدون تقرح (تسبب ٤٪ من الحالات).
- ٥ - ظهور صداع شديد وقىء.
- ٦ - ارتفاع درجة الحرارة مع رعشة وألم فى الظهر وفى الأطراف مع ظهور تسلخات فى الجلد.
- ٧ - ظهور تسمم عام.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تجنب لمس الحيوانات المريضة والحاملة للميكروب وكذلك الحشرات الحاملة للميكروب.
- ٢ - تجنب شرب الماء السطحى وبخاصة الموجود فى الحياة البرية.
- ٣ - حماية العاملين بالمختبرات والصيادين للحيوانات وذلك بارتدائهم قفازات جلدية وخصوصا عند سلخ الأرانب.
- ٤ - غسل اليدين وتطهيرهما بعد لمس الحيوانات المصابة والتي يعتقد أنها حاملة للميكروب.
- ٥ - طهى الأرانب المصيدة جيدا.
- ٦ - القضاء على القتران.
- ٧ - التحصين ضد المرض باللقاح المناسب.

مرض باستيريلاوسيز

Pasteurellosis

تعريف :

يسمى مرض حمى التيفوس (الفصيلة البقرية) أو حمى النقل (الفصيلة البقرية) أو التسمم الدموي (الفصيلة البقرية) وحوالا الغنم أو كوليرا الدجاج أو زكام الأرانب (التنفس بصعوبة).

أسباب العدوى للإنسان :

١ - باستيريلا مالتوسيدا *Pasteurella Multocida*.

٢ - باستيريلا هيموليتيكا *P. haemolytica*.

وجوده :

فى جميع أنحاء العالم.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - الحيوانات والدجاج - القطط والكلاب.

٢ - الإنسان.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - تنتقل العدوى عن طريق الخربشة أو العض من الحيوانات الحاملة للميكروب.

٢ - عن طريق استنشاق الهواء المحمل بالعدوى من رذاذ الإفرازات الناتجة عن الحيوانات والإنسان الحاملين للميكروب.

٣ - عن طريق شرب أو أكل طعام ملوث بالميكروب.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - التهاب وورم شديد مكان الجرح أو الخريشة أو العضة.

٢ - تقرح فى الجروح.

٣ - التهاب القصبة الهوائية.

٤ - التهاب رئوى.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - إعدام جميع كلاب الشارع لتحاشى عض الكلاب للإنسان وانتشار المرض.

٢ - تحصين الدواجن والحيوانات باللقاحات الخاصة بذلك.

مرض يرسينيوسيز

Yersiniosis

تعريف :

هو مرض منتشر في الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا والكنغو وأوروبا وأمريكا.

سبب العدوى :

- ١ - ميكروب يرسينيوزس السل الكاذب Yersiniosis Pseudotuberculosis.
- ٢ - ميكروب يرسينيوزس انتيروكوليتيكا Y. enterocolitica.

خواص الميكروب :

- ١ - يموت بالمطهرات العادية.
- ٢ - يموت عند درجة حرارة ٦٠ س لمدة ١٠ دقائق.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - الحيوانات مثل البقر والأرانب والقطة والكلاب الحاملة للميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان.

- ١ - عن طريق الملتحمة في العين وكذلك عن طريق الجهاز التنفسي وإلى الآن لم يعرف مصدر العدوى.
- ٢ - نقل العدوى قد يكون عن طريق التلامس المباشر للحيوانات الحاملة للميكروب.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - التهاب الغدد الليمفاوية مع انتفاخها.
- ٢ - ظهور الاستسقاء.

- ٣ - التهاب الأمعاء وظهور الجفاف على الإنسان.
 - ٤ - ظهور التهابات جلدية.
 - ٥ - كبر حجم الكبد.
 - ٦ - ارتفاع درجة الحرارة والتهاب المفاصل والملتحمة.
- طرق وقاية الإنسان من المرض :
- ١ - تعليم الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
 - ٢ - إعدام الفئران والجرذان.
 - ٣ - منع تلوث الأكل والشرب بواسطة الفئران.
 - ٤ - اتخاذ جميع التدابير السليمة عند العمل على الميكروب المسبب للمرض.

مرض سالمونلوسيز Salmonellosis

تعريف :

هو مرض يدخل جسم الإنسان عن طريق الغذاء الملوث بالميكروب ويسبب إسهالا وقيئا وإجهادا للجسم.

سبب المرض :

- ١ - ميكروب سالمونيلوزس تيفميوريم *S. typhimurium*.
- ٢ - ميكروب سالمونيلوزس انتريتيديس *S. enteritidis*.
- ٣ - ميكروب سالمونيلوزس كوليرا سيس *S. cholerae*.

مصدر العدوى للإنسان وطرق نقلها إليه :

- ١ - الحيوانات والطيور والأسماك والضفادع والحشرات والكلاب والقطط والقرود.
- ٢ - المياه السطحية ومياه المجارى.
- ٣ - لحوم الحيوانات الطازجة والمبردة والمجمدة الملوثة بالميكروب.
- ٤ - الدواجن والبيض الملوثة بالميكروب.
- ٥ - منتجات اللحوم الملوثة بالميكروب.
- ٦ - الألبان ومنتجاتها الملوثة بالميكروب.
- ٧ - الخضراوات الملوثة بالميكروب.

فترة حضانة المرض فى الإنسان :

تأخذ فترة الحضانة فى الإنسان من ١٢ - ٣٦ ساعة.

طرق نقل العدوى :

- ١ - أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والخضراوات الملوثة بالميكروب.

٢ - شرب الماء الملوّث بالميكروب.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - غثيان وقيء وألم فى البطن وإسهال.
- ٢ - ارتفاع فى درجة الحرارة وشعور بالبرودة وارتعاش.
- ٣ - صداع وقلق ودوخة.
- ٤ - ضعف فى العضلات وشعور بالإجهاد.
- ٥ - رائحة البراز مثل الفراخ ولونه أخضر.
- ٦ - الأعراض تستمر ٢ - ٣ يوم وحوالى ٠,٢ - ٠,٥ ٪ من المرضى يكونون حاملين للميكروب.

طرق الوقاية من المرض للإنسان :

- ١ - الكشف عن الحيوانات وعزل المريضة وعلاجها.
- ٢ - عدم أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها إلا بعد طهيها جيدا.
- ٣ - غلى الحليب أو تعقيمه.
- ٤ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٥ - تعقيم ملايس العاملين فى المزارع وتطهير أيديهم.
- ٦ - أخذ الاحتياطات الواجبة عند العمل على الميكروب فى المختبرات.
- ٧ - عدم شرب المياه السطحية.
- ٨ - يجب معالجة مياه المجارى صحيا حتى نمنع انتشار المرض.
- ٩ - عدم أكل الخضراوات إلا بعد غسلها جيدا.

مرض كامبيلو بكتريوسيز

Campylo Bacteriosis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له إسهالا وآلاما فى البطن.

سبب المرض :

ميكروب كامبيلو بكتري جيجونى *Campylobacter jejuni*.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - الحيوانات والطيور والخضراوات الموجود بها الميكروب.

٢ - الماء والألبان الملوثة.

٣ - الإنسان.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - تنتقل العدوى للإنسان عن طريق أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والخضراوات الملوثة بالميكروب.

٢ - عن طريق شرب الماء الملوث بالميكروب.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - تظهر الأعراض بعد ١٠ أيام من العدوى.

٢ - غثيان وقيء وإسهال وآلام فى البطن.

٣ - إسهال لمدة ٣ - ٥ أيام.

٤ - عدم شرب المياه السطحية.

٥ - ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - تعقيم أو غلى الألبان جيداً.
- ٣ - طهى اللحوم جيداً.
- ٤ - عدم شرب المياه السطحية.
- ٥ - استخدام المطهرات لتطهير الأماكن والأيدى ومنها هيبو كلوريت الكالسيوم والفينول و ٧٠٪ كحول إيثيلي ومركبات الأمونيوم.
- ٦ - علاج المرضى بالمضادات الحيوية ومنها ارثيروميسين وكلورا مفينيكول ونيومايسين وكاتاميسين وجنتاميسين.

مرض فيبروبارا هيموليتك Vibro Parahaemolyticus Infection

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له قيء وإسهال وأحياناً يكون مدمماً.

سبب المرض :

ميكروب فيبرواهيموليتك Vibrio parahaemolyticus.

فترة الحضانة :

تكون من ٢ - ٤٨ ساعة وعادة تكون ١٢ ساعة.

مصدر العدوى للإنسان :

الطعام الخام من مصدر بحري مثل المحاريات والأسماك ومنتجاتها الحاملة للميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

عن طريق التغذية بالأسماك ومنتجاتها والمحاريات والحاملة للميكروب.

أعراض المرض في الإنسان :

١ - غثيان وقيء وإسهال مائي وأحياناً يكون مدمماً.

٢ - ارتفاع درجة حرارة الجسم.

٣ - يشفى بعد يومين.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - طهي الطعام جيداً.

٢ - تبريد الطعام سريعاً في كميات صغيرة.

- ٣ - منع التعرض للأسماك الملوثة.
- ٤ - تطهير الأوعية المستخدمة.
- ٥ - تعريف الأفراد بالمرض وكيفية الوقاية منه.
- ٦ - عدم استخدام ماء البحر في غسيل الطعام.

مرض إيشيريشياكولي

Enteropathogenic E. Coli infection

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان بألم فى البطن وإسهال مائى.

سبب العدوى :

ميكروب ايشيريشيا كولى E. coli.

فترة الحضانة :

تختلف تبعا لنوع الإيشيريشياكولى.

فتكون من ٨ - ٢٤ ساعة (١١ ساعة).

أو تكون ٨ - ٤٤ ساعة (٢٦ ساعة).

مصدر العدوى للإنسان :

السالون والجبن وبدائل القهوة، وأكل اللحوم ومنتجاتها وشرب الحليب ومنتجاته والمعجنات الملوثة ببراز المرضى وحاملى الميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

بالتغذية على السالون والجبن وبدائل القهوة.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - ارتفاع درجة الحرارة.

٢ - رعشة وصداع.

٣ - ألم فى البطن والعضلات.

٤ - إسهال مائى.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تبريد الطعام مباشرة وفى أحجام صغيرة.
- ٢ - طهى الطعام جيدا.
- ٣ - عدم استعمال المياه السطحية ومياه المجارى.
- ٤ - تعليم الأفراد بالمرض وطبيعته كيفية الوقاية منه.

مرض باسيلس سیرس

Bacillus Cereus Gastroenteritis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب إلتهاابا فى الجهاز الهضمى.

سبب العدوى :

الجرثومة العصوية لميكروب Bacillus cereus.

فترة الحضانة :

من ٨ - ١٦ ساعة (١,٥ - ٥ ساعات).

مصدر العدوى للإنسان :

الكاستر والمنتجات الحيوانية والأرز والسجق والمقانىق والصلصات وأطباق اللحوم فى الخبز (رغيف حواوشى).

طرق نقل العدوى للإنسان :

عن طريق التغذية بالكاستر والمنتجات الحيوانية والأرز والسجق والمقانىق والصلصات وأطباق اللحوم فى الخبز والملوثة جميعها بالميكروب.

أعراض المرض فى الإنسان :

غثيان وقىء وإسهال مائى وآلام فى البطن.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تبريد الطعام سريعا فى كميات صغيرة.
- ٢ - الطهى الجيد للمواد الغذائية.
- ٣ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٤ - يحفظ الأكل عند درجة حرارة ٦٥ س أو أعلى.
- ٥ - إعادة تسخين الأكل عند ٧٠ س أو أكبر.

مرض الزحار (الديزونتاريا) Shigellosis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له مغصا وإسهالا مدمما.

سبب المرض :

- ١ - شيجلا فلكنسيري *S. flexneri*.
- ٢ - شيجلا ديزونتاري *S. dysenteriae*.
- ٣ - شيجلا بويدى *S. boydii*.

فترة الحضانة :

من ١ - ٧ أيام (٤ أيام).

مصدر العدوى للإنسان :

الحليب - البقوليات - البطاطس - التونة والجمبرى - والرومى.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة.
- ٢ - غثيان وقىء وإسهال مدمم ومغص.
- ٣ - رعشة وصداع.
- ٤ - شعور بالتبول.
- ٥ - شعور بالإجهاد.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.

- ٢ - اتباع الشروط الصحية فى الغذاء والتغذية.
- ٣ - عدم استخدام المياه السطحية.
- ٤ - قتل الذباب.
- ٥ - غلى الحليب قبل استخدامه وطهى اللحوم جيدا.

مرض المكور العنقودى Staphylococcal Intoxication

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له إسهال وألم فى البطن.

سبب المرض :

ميكروب المكور العنقودى Staph aureus.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - الإنسان المريض بأمراض الجهاز التنفسى.
- ٢ - الطعام الملوث بالميكروب.
- ٣ - التهاب الضرع.
- ٤ - حليب خام وأكل جبن بهما الميكروب.
- ٥ - كاستر - القشدة - اللحوم ومنتجاتها - الدواجن وأسماك ومنتجاتها الملوثة بالميكروب.

طريقة نقل العدوى للإنسان :

- ١ - التغذية على اللحوم ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها والدواجن والأسماك الملوثة بالميكروب.
- ٢ - شرب الحليب من الحيوانات المريضة.
- ٣ - استنشاق الهواء المحمل بالرداذ من الأفراد المراضى بأمراض الجهاز التنفسى.

فترة الحضانة :

فترة الحضانة من ٢ - ٤ ساعات (٣ ساعات) من بعد الأكل.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - الأعراض تظهر تبعا لكمية التوكسين وهى تظهر من ٣٠ دقيقة - ٨ ساعات.
- ٢ - غثيان ونزول لعاب وقىء وألم فى البطن وإسهال مدمم.
- ٣ - شعور بالصداع والإجهاد.
- ٤ - ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.
- ٥ - خفض ضغط الدم.
- ٦ - المرض يختفى بدون علاج فى خلال ٢٤ - ٧٢ ساعة.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - عدم تعرض الأيدى الموجود عليها دمامل للغذاء.
- ٣ - وضع الأكل فى الثلاجة يمنع نمو الميكروبات.
- ٤ - الكشف البيطرى على الحليب ومنتجاته.
- ٥ - تعقيم اللبن أو غليه.
- ٦ - طهى اللحوم ومنتجاتها جيدا.

مرض بوتيليزم

Botulism

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له شللاً في الجهاز التنفسي ويعمل على أطراف الأعصاب.

سبب المرض :

كلويستريديم بوتيلينم (لا هوائي) Clostridium botulinum.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - أمعاء وكبد البقر والطعام الموجود به الميكروب.
- ٢ - المعلبات وخاصة الموجود فيها طعام البحار واللحوم واللحوم المصنعة والخضراوات والفواكه الملوثة بالميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - عن طريق أكل أمعاء وكبد البقر والمعلبات الموجود بها الميكروب والميكروب يخرج التوكسين الذي يمتص ويذهب إلى أطراف الأعصاب.
- ٢ - وأحيانا تنتقل عن طريق الجروح.

فترة الحضانة :

من ١٨ - ٣٦ ساعة ونادرا ٢ ساعة أو ٨ أيام وهذه الفترة تعتمد على كمية التوكسين.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - غثيان وقيء وألم في البطن.

٢ - مرض عصبي وقلق.

٣ - ازدواج الرؤية.

٤ - عسر البلع.

٥ - شلل فى الجهاز التنفسى ثم الموت.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - الكشف الدورى على المعلبات الموجود بها الغذاء.

٢ - تعليم الأفراد بالمرض وطريقة الوقاية منه .

٣ - معلبات الغذاء فى المنازل تغلى قبل الحفظ.

٤ - التأكد من عدم وجود ميكروب البوتيليزم فى أعلاف الحيوانات.

٥ - التحصين ضد المرض باللقاح المناسب.

مرض الأريزونا Arizona Infection

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له ألماً في البطن وإسهالاً وارتفاعاً في درجة الحرارة.

سبب العدوى :

ميكروب هينو هاوى A. Hinohawii.

فترة حضانة المرض فى الإنسان :

هى من ٤ - ٤٦ ساعة (٢٤ ساعة).

مصدر العدوى للإنسان :

الدجاج والرومى والقشدة والآيس كريم والكستر المحتوى على البيض والملوثة جميعاً بالميكروب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

تناول لحوم الدجاج والرومى والقشدة والآيس كريم والكستر المحتوى على البيض والملوثة جميعاً بالميكروب.

أعراض المرض فى الإنسان :

ألم فى البطن وإسهال وغثيان ورعشة وصداع وضعف وارتفاع فى درجة الحرارة.

طرق الوقاية من المرض للإنسان :

١. - تعريف الناس بالمرض وطرق الوقاية منه.

- ٢ - طهى اللحوم جيدا.
- ٣ - غلى الحليب أو تعقيمه.
- ٤ - اتباع الطريق الصحية فى الغذاء والتغذية.
- ٥ - علاج الأفراد تبعا للأعراض عند الطبيب.

مرض الحمى القرمزية

Scarlet Fever

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له التهاب الزور واللوزتين وبقع حمراء على الجلد.

سبب المرض :

ميكروب المكور العنقودي Streptococcus Pyogenes.

فترة حضانة المرض في الإنسان :

من ١ - ٣ أيام.

مصدر العدوى وطرق نقلها للإنسان :

شرب الحليب الخام وأكل الآيس كريم والبيض والكستر الملوثة بالميكروب.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - التهاب الزور واللوزتين.
- ٢ - ألم عند البلع.
- ٣ - ارتفاع درجة الحرارة وصداع.
- ٤ - غثيان وقيء.
- ٥ - ظهور بقع حمراء على الجلد.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - يستبعد الأفراد المرضى بأمراض الجهاز التنفسي وعلاجهم.
- ٢ - يستبعد الأفراد المرضى بأمراض جلدية وعلاجهم.
- ٣ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

الباب الثاني

**الأمراض الفيروسية التي تنتقل
من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان**

مرض نيوكاسل

Newcastle Disease

تعريف :

هو مرض شديد العدوى ومهلك للطيور المنزلية والبرية يتميز بأنه يسبب التهاباً رئوياً واضطراباً عصبياً.

سبب المرض :

فيروس نيوكاسل Virus Newcastle.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - إفرازات الجهاز التنفسي من الطيور المصابة.
- ٢ - رذاذ الفيروس في الهواء عند التحصين.
- ٣ - الدجاج والرومي والبط والحمام والطيور الأخرى الحاملة للفيروس.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - بتلامس ومسك الطيور الحية والمذبوحة والملوثة بالفيروس.
- ٢ - عند دراسة الفيروس في المختبرات.

فترة الحضانة في الإنسان:

من ٥ - ٦ أيام.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - التهاب القرنية المحبب.
- ٢ - التهاب الغدد.
- ٣ - نزيف تحت الجلد.

٤ - أوديعا فى جفون العين.

٥ - نزيف تحت القرنية.

٦ - التهاب فى الأوعية الدموية فى العين.

٧ - ارتفاع درجة الحرارة مع رعشة.

٨ - صداع وتوعك.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

١ - تعريف الأفراد بالمرض ومقاومته.

٢ - اتخاذ التدابير الصحية عند التعامل مع الطيور المريضة.

٣ - الاهتمام بالنواحي الصحية بتربية الطيور.

٤ - منع نقل الطيور المريضة إلى مكان به طيور سليمة.

٥ - علاج الإنسان تبعاً للأعراض عند الطبيب.

مرض نتوء ملكرز Milkers nodules أو مرض عجيزة ملكرز Milkers warts

تعريف:

هو مرض يصيب الإنسان الذى يحلب الأبقار التى تعاني من عدوى جلدية والتي تكون فى الضرع والحلمات والتي تُشخص على أنها جدري البقر.

سبب المرض:

- ١ - فيروس جدري البقر .Cow pox.
- ٢ - فيروس جدري البقر الكاذب .Pseudo - Cow pox.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - البثرات الموجودة على الحلمات للحيوان المريض.
- ٢ - الأبقار وخاصة منها الحلوب الحامل للفيروس.

طرق نقل العدوى للإنسان:

التلامس المباشر مع حلمات وضرع البقر المريض وخاصة إذا كانت يد الحلاب بها خدوش أو جروح فينتقل إليها الفيروس.

فترة حضانة المرض فى الإنسان:

من ٥ - ٧ أيام.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - تظهر العدوى بنوعين فى يد وذراع الحلابين:
(أ) النوع الأول يتميز بوجود بثرات عديدة ثم تكبر وتكون حويصلة وطفح جلدى ثم تتحول إلى صديد ثم قشر ثم تقع وتترك سطحاً معافاً.

(ب) النوع الثانى وهى تظهر على يد الحلابيين ولا تكون عديدة والبثرات تبدأ ببثرة محاطة بالتهاب جلدى وإحمرار للبثرة ويكون قطرها ١ - ٢ سم ومؤلم إلى حد ما ويصحبها شعور بالهرش وتورم فى الغدد الليمفاوية الإبطية.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - علاج المريض.
- ٣ - يجب أخذ الاحتياطات الواجبة عند الحليب وخاصة إذا كان توجد جروح أو خدوش فى أيدي الحلابيين.

مرض الحمى القلاعية

Foot and mouth disease

تعريف:

هو مرض يصيب البقر والغنم والماعز والخنازير ويتميز بطفح على الغشاء المخاطي للفم وطفح جلدي على الضرع ويوجد بين الأظلاف.

سبب المرض:

فيروس الحمى القلاعية (له سبعة أنواع). Foot and mouth virus.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - عن طريق محتويات البثرات الموجودة في فم وجلد الحيوانات المريضة.
- ٢ - عن طريق الحليب من الأبقار المريضة.
- ٣ - البقر والغنم والماعز والخنازير المريضة.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - شرب الحليب الخام وأكل الزبدة والجبن من الحيوانات المريضة.
- ٢ - عن طريق رذاذ إفرازات الغدد اللعابية من الحيوانات المصابة فيصيب مباشرة الغشاء المخاطي لفم الإنسان.
- ٣ - مباشرة عن طريق ولمس الخدوش والجروح في الأيدي بالفيروس من الحيوانات المريضة وهذا يصيب الجزارين عند ذبح وسلخ الحيوانات.

فترة حضانة المرض في الإنسان:

من ٢ - ٨ أيام.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - ارتفاع من درجة الحرارة.
- ٢ - آلام عند البلع.
- ٣ - جفاف وتقرح والتهاب فى الفم.
- ٤ - ضعف ووهن.
- ٥ - فقد الشهية للطعام.
- ٦ - سرعة ضربات القلب.
- ٧ - ظهور بثرات على اليدين والقدمين وفى الفم.
- ٨ - يتم الشفاء تمامًا خلال أسبوع أو أسبوعين من ظهور الأعراض.

طرق الوقاية من المرض:

- ١ - وضع الحيوانات المصابة فى الحجر الصحى ومعالجتها.
- ٢ - شرب الحليب من حيوانات سليمة.
- ٣ - تعقيم اللبن أو غليه قبل الاستعمال وتصنيعه.
- ٤ - تطعيم الحيوانات باللقاح الخاص.
- ٥ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٦ - علاج الأفراد عند الطبيب.

مرض التهاب الجلد المعدى Contagious pustular dermatitis

تعريف:

هو مرض يصيب الغنم والماعز والجمال والإنسان.

سبب العدوى:

فيروس باستيلوار المعدى Virus Contagious pustular

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - القشرة الموجودة على الجزء المريض من جلد الحيوان والفيروس موجود فيها ويعيش لمدة شهر في الجفاف والبرودة.
- ٢ - الغنم والماعز والجمال.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - خلال الخدوش والجروح الموجودة في الجلد والأغشية المخاطية في الإنسان.
- ٢ - الأفراد الذين يتعاملون مع الفيروس يمكن أن يصيبهم إذا لمس جلدتهم أو أغشيتهم المخاطية المخدوشة أو المجروحة.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - التهاب الجلد وكذلك الفم عند ظهور طفح عليها، كذلك توجد التهابات وطفح على اللثة واللسان والخدود والشفيتين.
- ٢ - الشفتين والأرجل تصاب بتقرح وغالبًا توجد في الأيدي والأذرع وتحت الكوع والركبة.
- ٣ - تكون شكل البثرات مثل العدس ومؤلمة تسبب الهرش إذا ضغط عليها.

٤ - الغدد الليمفاوية من مكان المرض تتضخم.

٥ - المريض يشفى بعد ثلاثة أسابيع.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

١ - تغيير المراعى التى يوجد به قشرة الجلد التى سقطت من الحيوانات المريضة فى المراعى.

٢ - تحصين حملان الغنم.

٣ - يجب اتخاذ الاحتياطات الصحية عند التعامل مع الحيوانات المريضة.

٤ - تعريف الإنسان بالمرض والوقاية.

٥ - الذهاب إلى الطبيب لعلاج الجروح والأعراض التى تظهر.

مرض السعار

Rabies

تعريف:

يعرف بمرض الخوف من الماء والهواء وهو متلف للجهاز العصبي ويصيب الكلاب والقطط والذئاب وجميع الحيوانات المنزلية أو البرية وينتقل إلى الإنسان عن طريق العض من الحيوان المريض ويصحبه تشنج وانقباض المرئ والجهاز التنفسي وينتهي بالشلل.

سبب المرض:

فيروس السعار ليسا فيروس Lyssa Virus .
يوجد منه نوعان: فيروس ثابت وفيروس الشارع وهو أخطر.

مصدر العدوى للإنسان:

الحيوانات بجميع أنواعها مثل القطط والكلاب والثعالب والبقر والطيور.. الخ والإنسان أيضًا. ويوجد الفيروس في الخلايا العصبية واللعاب والبول والغدد الليمفاوية والحليب ونخاع الجهاز العصبي.

خواص الفيروس:

يتأثر بضوء الشمس ويموت بالأشعة فوق البنفسجية وكذلك بالمطهرات مثل الفينول ويمكن أن يعيش لعدة أسابيع عند درجة حرارة ٤٠° س وتظهر العدوى بعد ١٢ - ٢٥ يومًا من العدوى بالعض. ويظهر اللعاب بعد العدوى من ٥ - ٦ أيام.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - عن طريق عض حيوان مريض للإنسان.
- ٢ - عن طريق عض إنسان مريض لآخر.

- ٣ - لمس الجروح الموجودة بالجلد بفيروس الصعار.
- ٤ - لمس الجروح الموجودة بالغشاء المخاطي بالفيروس فيخترق الفيروس الغشاء المخاطي ويدخل إلى مكانة.
- ٥ - استنشاق الفيروس وتحصل نادرًا.
- ٦ - بعد التحصين بفيروس الصعار.
- ٧ - عن طريق شرب لبن من حيوان مريض فيدخل الفيروس في الغشاء المخاطي المجروح للجهاز الهضمي.
- ٨ - عن طريق لمس لعاب الحيوانات المريضة بأيدي مجروحة أو مخدوشة.

فترة حضانة المرض:

- يختلف تبعًا لمكان العض.
- إذا كان في اليدين تكون فترة الحضانة ٤٥ يومًا.
 - إذا كان في الأرجل تكون فترة الحضانة ٧٥ يومًا.
 - إذا كان في الرقبة تكون فترة الحضانة ٣٥ يومًا.
- وكذلك تعتمد فترة الحضانة على كمية الفيروس وشدة العضة وغنى المكان بالأعصاب ، والفيروس يدخل في الجسم ويصل إلى الجهاز العصبي واللعاب والكلية والرئة وفي غدد الثدي.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - إفراز الفيروس في الغدد اللعابية.
- ٢ - صداع وإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة.
- ٣ - شعور بالعصبية والقلق.
- ٤ - ورم في مكان العضة وألم شديد بها.
- ٥ - تنفس بعمق وبصوت.

- ٦ - انقباضات فى الحجاب الحاجز وتنتهى بتوقف مؤقت.
 - ٧ - المريض يخاف من الماء والهواء.
 - ٨ - المريض يهز رأسه إلى الخلف بشدة والظهر يتقوس.
 - ٩ - شلل فى المرئ وعدم القدرة على الشرب.
 - ١٠ - وقوف التنفس والقلب ثم الموت.
- طرق وقاية الإنسان من المرض:**
- ١ - تحصين الكلاب والقطط.
 - ٢ - قتل كلاب الشوارع.
 - ٣ - منع استيراد الكلاب والقطط من الأماكن الموبوءة.
 - ٤ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منها.
 - ٥ - يوضع الكلب الذى عض أى إنسان تحت الملاحظة لمدة عشرة أيام وإذا ظهر على الكلب أعراض يعدم. ويؤخذ رأسه وترسل إلى المختبرات الخاصة فى ثلاثة لعزل مسبب المرض.
 - ٦ - إعدام الحيوانات الحاملة للميكروب.
 - ٧ - علاج موضعى بالماء والصابون بكثرة للجروح الناتجة عن العض أو التى لامست الميكروب عن أى طريق.
 - ٨ - يعالج الجرح بالكى بمركبات الأمونيوم مثل ستافلون حيث إنها تؤثر على الفيروس وتضعه ثم يموت.
 - ٩ - خياطة الجرح بعد ٤٨ - ٧٢ ساعة بعد الغسيل والكى.
 - ١٠ - تحصين الأفراد باللقاح الخاص بذلك.
 - ١١ - العلاج بحقن التيتانوس والمضادات الحيوية.
 - ١٢ - قتل الخفافيش.
 - ١٣ - توضع الكلاب والقطط المستوردة فى الحجر الصحى البيطرى لمدة ٤ - ٦ شهور.

مرض حمى الكونغو

Crimean-congo haemorrhagic fever (Congo fever)

تعريف :

هو مرض موجود فى الغنم والماعز والقُرَاد وينتقل إلى الإنسان ويسبب نزيفاً فى اللثة والمعدة.

سبب المرض :

فيروس كريم كونغو - حمى النزيف.
Crimean - congo haemorrhagic fever virus.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - القُرَاد (حشرة تمتص الدم) الحامل للفيروس.
- ٢ - الغنم والماعز والبقر الحامل للفيروس.
- ٣ - الطيور تنقل صغار القُرَاد من مكان لآخر وليست حاملة للفيروس.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - بواسطة عضّة القراد البالغ والحامل للفيروس.
- ٢ - ينتقل بواسطة فمّ القراد باليد فينتقل الفيروس من القراد إلى جلد اليد المجرّوح.
- ٣ - ينتقل عن طريق ذبح وسلخ الحيوانات مباشرة فينتقل الفيروس من الحيوانات إلى جلد الإنسان المجرّوح والمخربش.
- ٤ - ينتقل من الأفراد المرضى الذين ينزفون إلى الأفراد الأصحاء عن طريق دخول الفيروس عن طريق الجروح فى الأفراد الأصحاء.

فترة حضانة المرض فى الإنسان:

من ٣ - ١٢ يوماً من عضه القراد.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة مع رعشة.
- ٢ - صداع وغثيان وقيء وألم فى الظهر.
- ٣ - اسهال.
- ٤ - احمرار الرقبة والوجه والملتحمة فى العين وتظهر نقط حمراء فى الجلد وفى الفم وبعد العدوى بأربعة أيام يظهر النزيف.
- ٥ - يخرج النزيف من اللثة ومن الغشاء المخاطى بالمعدة.
- ٦ - نزول بول مدمم.
- ٧ - نتيجة لنزيف الدم ينتهى بالموت.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - الابتعاد عن الأماكن المملوءة بالقراد.
- ٣ - قتل القراد بالمبيدات الحشرية.
- ٤ - عزل المريض وينقل له دم وسوائل.
- ٥ - تطهير الأماكن بالمطهرات المناسبة.
- ٦ - عند التعامل مع الحيوانات المريضة يرتدى الفاحص ملابس خاصة ثم بعد ذلك تطهر.
- ٧ - تحصين باللقاح المناسب.
- ٨ - علاج المرضى تبعاً للأعراض.

مرض التهاب الدماغ الياباني Japanese Encephalitis

تعريف:

هو مرض يصيب اليابانيين والصينيين والفيتناميين وجنوب شرق آسيا وبروما وسيرلانكا بواسطة الباعوض ويسبب التهاباً في المخ.

سبب العدوى:

فيروس أربوفيروس ب Barbovirus - فلافيفيروس Flavivirus .

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - الخنازير المريضة بهذا الفيروس.
- ٢ - الباعوض الحامل للفيروس.
- ٣ - البقر والبط والدواجن المريضة.

طرق نقل العدوى للإنسان:

عن طريق عض التاموس الحامل للفيروس للإنسان.

فترة الحضانة في الإنسان:

من ٥ - ١٥ يوماً.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة.
- ٢ - التهاب في الدماغ.
- ٣ - صداع وإجهاد.
- ٤ - أحياناً يكون فيه إغماء.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - قتل البعوض بالمبيدات الحشرية مثل الملاثيون.
- ٣ - الابتعاد عن الأماكن الموجودة فيها البعوض.
- ٤ - تحصين الأفراد باللقاح الخاص بذلك.
- ٥ - علاج المرض تبعاً للأعراض.

مرض حمى الوادى المتصدع Rift Valley Fever

تعريف:

هو مرض يسبب التهاب الكبد فى الحيوانات: الغنم والبقر والجمال ، وينتقل للإنسان عن طريق عض الباعوض.

سبب المرض:

فيروس حمى الوادى المتصدع Rift valley virus .

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - الأبقار والغنم والماعز.
- ٢ - الباعوض الحامل للفيروس.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - عن طريق عض البعوض الحامل للفيروس.
- ٢ - عن طريق لمس اللحوم الملوثة بالفيروس.
- ٣ - استنشاق الهواء الملوث بالفيروس.
- ٤ - لمس الفيروس بالجروح فى الإنسان.
- ٥ - يجوز نقل الفيروس عن طريق شرب الحليب الخام.

فترة الحضانة فى الإنسان:

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة فى الجسم.
- ٢ - صداع وألم فى الظهر.
- ٣ - التهاب المخ وهلوسة.

٤ - فقد مركز الرؤية.

٥ - ظهور الصفراء.

٦ - نزيف حاد مع تعب فى الكبد.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.

٢ - قتل الباعوض بالمبيدات الحشرية.

٣ - العناية بالتعامل مع الحيوانات ومنتجاتها الحاملة للفيروس.

٤ - الحذر التام والعناية بالاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الفيروس فى المختبرات.

٥ - تحصين الحيوانات باللقاح المناسب لذلك.

٦ - علاج الأفراد تبعاً للأعراض عند الطبيب.

مرض حمى الصفراء

Yellow Fever

تعريف:

هو مرض يصيب القروء وينتقل للإنسان عن طريق البعوض ويسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة والتهاب الكبد والكلى وظهور الصفراء والنزيف والإجهاد.

سبب المرض:

فيروس فلافي فيبركس Flavivirus fibricus .

خواص الفيروس:

يعيش في درجة حرارة ٢٤° س أو أكثر وفي رطوبة ٦٠٪ ويتحمل الفصول الجافة.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - القروء الحاملة للفيروس.
- ٢ - البعوض الحامل للفيروس.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- عن طريق عض البعوض الحامل للفيروس.
- التلامس المباشر للفيروس للجلد المجروح أو المخدوش في المختبرات بالصدفة.

فترة الحضانة:

من ٣ - ٦ أيام.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة برعشة.

- ٢ - صداع وألم فى الظهر.
- ٣ - غثيان وقىء نتيجة نزيف من المعدة ويكون لونه أسود وبه الصفراء.
- ٤ - الفيروس يخترق أنسجة الغدد الليمفاوية ويغزو الدم ويصل إلى الكبد والطحال والنخاع العظمى وتظهر الصفراء على المريض.
- ٥ - نزيف الدم ويوجد به نسبة عالية من الألبومين.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطريقة الوقاية منه.
- ٢ - قتل البعوض ويرقاته بالمبيدات الحشرية.
- ٣ - عدم التواجد فى مناطق البعوض.
- ٤ - تطعيم ضد المرض باللقاح المناسب.
- ٥ - علاج المرضى تبعاً للأعراض.
- ٦ - عند السفر من مكان موبوء إلى مكان سليم لابد من الحصول على شهادة تفيد خلو الإنسان من المرض تبعاً.

الباب الثالث

الأمراض الفطرية التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان

الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان

مرض القوباء الحلقية

Ringworm (Tinea)

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان والحيوان ويبدأ صغيراً ثم يكبر ويصيب صغار السن أكثر من الكبار.

سبب المرض :

كيراتيوميسز، ميكروسبورم، ترايكوفيتون، ابيدرموفيتون.

Epidermophyton – Trichophyton – Microsporum – Keratinomyces.

أنواع المرض :

- ١ - قوباء الجسم.
- ٢ - قوباء الرأس.
- ٣ - قوباء الذقن.
- ٤ - قوباء القدم.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - أدوات الحلاقة الملوثة بالفطر.
- ٢ - غطاء الحيوانات.
- ٣ - الإنسان والكلاب والقطط والخيول والجمال والبقر والطيور.

طرق انتقال العدوى للإنسان :

مباشرة باللمس للحيوانات والأدوات الملوثة بالفطر.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - طفح جلدى أحمر ثم بثرات ووسطها قشرة حولها حويصلة قطرها ٠,٠٥ - ٥ سم ويمكن أن تكون واحدة أو أكثر، والأطفال أكثر عرضة للعدوى من الكبار.
- ٢ - تؤدى العدوى إلى الصلع أحياناً وفى بعض الأحيان ظهور تقرح عميق بالجلد.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - استخدام مضادات الفطريات فى العلاج.
- ٣ - غلى وتعقيم الملابس الخاصة بالمريض.
- ٤ - تطهير أقفاص الحيوانات بمضادات الفطريات.
- ٥ - وضع مضادات الفطريات على الحبوب عند تخزينها حتى لا تنتقلها الفئران.
- ٦ - عزل الحيوان المريض وعلاجه.
- ٧ - عدم لمس الحيوانات المريضة.
- ٨ - اتخاذ الإجراءات اللازمة عند التعامل مع الفطر فى المختبرات.

مرض الفطر العام (شامل الجسم كله)

Systemic Mycosis

تعريف:

هو مرض مزمن موجود في الغدد الليمفاوية والجلد وفي الأنسجة على هيئة بثرات لينة وتنفجر وتتقرح.

سبب المرض:

أسبورتركيم سكنكى Sporprtrichum Schenekii .

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - التربة المحتوية على الفطر.
- ٢ - تنظيف الصوف وغزله الملوث بالفطر.
- ٣ - النباتات والخضراوات الملوثة بالفطر.
- ٤ - الخيول والكلاب والقطة والفئران والجرذان المريضة.

طرق نقل العدوى للإنسان:

تنتقل العدوى مباشرة عن طريق لمس الحيوان المصاب أو تنتقل العدوى عن طريق الأتربة الموجودة بها الفطر للجروح الموجودة بجسم الإنسان.

فترة حضانة المرض:

من ٢ أسابيع - ٣ أشهر.

أعراض المرض في الإنسان:

بثرات دائرية طرية متحركة تحت الجلد توجد على الأصابع ثم بعد ذلك تمسك في الجلد ويكون لونها قاتماً ثم يسود لونها وتتقرح بعد عدة أيام وأصابع

ثم تنتشر هذه البثرات على طول الغدد الليمفاوية ثم بعد ذلك تتقرح البثرات وتفرز صديدًا.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - حماية جروح الجسم فى مصانع الصوف بالملابس الخاصة بذلك حتى لا يتسرب الفطر إلى الجسم.
- ٢ - قتل الفئران.
- ٣ - العلاج بواسطة يود البوتاسيوم.
- ٤ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٥ - علاج المريض تبعاً للأعراض التى تظهر عليه فى المستشفى.

مرض أسبيريجلوسيز

Aspergillosis

(يسمى مرض الفطر الرئوى او فطر الشعب الهوائية)

تعريف:

هو مرض يوجد على هيئة ورم حبيبي فى الجلد وفى الأذن الخارجية وفى الجيوب الأنفية والعين والشعب الهوائية والرئة والعظم وفى سحاء المخ.

سبب المرض:

أسبيروجلوس فيوميغاتس *Aspergillus Funigatus*.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - موجود فى الطبيعة.
- ٢ - الحشرات والطيور والحيوانات الأليفة والبقر والدواجن والبط والحمّام.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - استنشاق الفطر من التراب أو من الحيوانات والطيور.
- ٢ - استنشاق الفطر من الحمام بالفم عندما يغذى الفرد الحمام بفمه.

أعراض المرض فى الإنسان:

يصيب الفطر المرضى بالسكر والسل والسرطان، حيث تكون المناعة عندهم ضعيفة، وكذلك يصيب الأفراد الضعاف الذين يعالجون لمدة طويلة بالمضادات الحيوية والكورتوزونات، وتظهر حساسية من الفطر وكحة مصحوبة بصديد ودم وارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة وفقد فى السمع وهرش وأودىما وآلام شديدة فى مكان المرض.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعرف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - عدم استنشاق الأتربة الملوثة بالفطر.
- ٣ - عدم تغذية الحمام بالقم.
- ٤ - استعمال مضادات الفطريات لتطهير المكان.
- ٥ - علاج الأفراد بالنسباتين.

مرض هستوبلازموس

Histoplasmoïs

(يسمى مرض دارلنج - فطر الخلية المبطن للخلايا)

تعريف:

هو مرض يصيب الخلايا المبطنة للغدد الليمفاوية والطحال والكبد والرئة والأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية وكثيراً ما يصيب الجلد وأحياناً الجهاز العصبى والعظم.

سبب المرض:

هستوبلازما كابسيوليتم *Histoplasma capsulatum*.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - التربة.
- ٢ - إفرازات الحيوانات المريضة.
- ٣ - البقر والخيول والقطط والغنم والفئران والخفافيش والدجاج والعُرس.

طرق نقل العدوى للإنسان:

استنشاق الفطر من التراب أو الحيوانات المصابة.

فترة الحضانة فى الإنسان:

من ٥ - ١٨ يوم.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - ارتفاع فى درجة الحرارة.
- ٢ - التهاب رئوى وكبدى وتضخم فى الطحال.

٣ - تقرح فى الأغشية المخاطية. (١٠)

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - عدم استنشاق الأتربة وبخاصة أثناء انتشار العدوى.
- ٣ - استخدام مضادات الفطريات لتطهير الأرض المنتشر بها العدوى من الحيوانات الحاملة للفطر.
- ٤ - عدم لمس إفرازات الحيوانات المرضى.
- ٥ - علاج الأفراد بالأمفورتسين ب.

مرض كوكسيديودوميكوسيز Coccidioidomycosis

تعريف:

هو مرض معد يصيب الجهاز التنفسي والجلد والأنسجة الداخلية والعظمية.

سبب المرض:

فطر كوكسيديودوس إيميتس *Coccidodes immitis*.

مصدر العدوى للإنسان:

١ - التربة.

٢ - البقر والغنم والكلاب والفئران.

طرق نقل العدوى للإنسان:

١ - خلال الجلد المجروح.

٢ - استنشاق الفطر وبخاصة خلال الفصول الجافة والمترية والملوثة بالفطر.

٣ - استنشاق الفطر من المختبرات عند العمل بالفطر.

فترة الحضانة:

هي من ١ - ٤ أسابيع.

أعراض المرض في الإنسان:

١ - حمى روماتيزمية.

٢ - رشح وكحة.

٣ - طفح جلدي.

٤ - التهاب سحائي.

٥ - ارتفاع درجة الحرارة.

٦ - نقص فى الوزن.

٧ - يسبب مرضاً عضالاً.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

١ - تعريف الإنسان بالمرض والوقاية منه .

٢ - عدم استنشاق الأتربة .

٣ - علاج الأفراد بالامفوترسين ب والسلفا والمضادات الحيوية والفيتامينات .

٤ - نقل دم للمريض .

مرض الكانديدياسيز

Candidiases

(ويسمى مونيلياسز - كانديدياسز)

تعريف:

هو مرض حاد يصيب الفم والحلق والمهبل والجلد والأظافر والشعب الهوائية والرئة والقلب ويسبب تسمماً دموياً وإلتهاباً سحائياً.

سبب المرض:

كانديدا البيكانس *Candida albicans*.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - الإفرازات من الفم والمهبل والجلد.
- ٢ - براز الحيوانات المريضة.
- ٣ - الطيور وجميع الثدييات والإنسان.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - لمس الإفرازات من الحيوانات المريضة أو الحاملة للخطر.
- ٢ - يمكن نقل العدوى للأطفال المولودة عن طريق لمس إفرازات المهبل عند الأم المريضة أو الحاملة للخطر.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - ألم وإحمرار وتقرح في الأماكن العامة.
- ٢ - الأظافر تجف وتتشقق.
- ٣ - ارتفاع في ضغط الدم.

- ٤ - ارتفاع درجة الحرارة.
- ٥ - التهاب الغشاء البلورى.
- ٦ - البصاق مدمم.
- ٧ - المرض يوجد تحت الإبط وتحت الثديين وفى ثنيات البطن.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - علاج الأفراد بمضادات الفطريات الخاصة بالفطر النستايين.
- ٣ - تطهير الأماكن بمبيدات الفطريات.
- ٤ - استعمال سلفات النحاس فى مزارع الدواجن.

مرض بلاستوميكوسيز

Blasto Mycosis

تعريف:

مرض مزمن: يتميز بوجود حبيبات صديدية فى أى جزء من جسم الإنسان والمكان المحبب للفطر، الجلد والرئة والعظم.

سبب المرض:

فطر بلاستوميكوزس Blastommyces .

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - إفرازات الجلد والبصاق من المرضى.
- ٢ - استنشاق الأتربة الملوثة بالفطر.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - احمرار الجلد وبخاصة الوجه والصدر والقدم.
- ٢ - بثرات فى الجلد بها صديد.
- ٣ - ارتفاع درجة الحرارة.
- ٤ - كُحَّة وألم فى الصدر.
- ٥ - نقص فى الوزن.
- ٦ - اعتلال فى الجسم.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الإنسان بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - العلاج ببيود البوتاسيوم.
- ٣ - علاج الأعراض.

الباب الرابع

**الأمراض الطفيلية التي تنتقل
من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان**

الفصل الأول

(١) بروتوزوا Brutozoa

مرض أميبيازيسز Amaebiasis

تعريف :

هو طفيل موجود في الأمعاء الغليظة للإنسان ويسبب إسهالاً مخاطياً مدمماً.

سبب المرض :

انتاميبا هيستوليتيكا *Entamoeba histolytica*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - القروذ والكلاب والقطط والخنازير الحاملة للطفيل.
- ٢ - الطعام الملوث باليد من حامل المرض.
- ٣ - تلوث مصادر المياه بالبروتوزوا.
- ٤ - الذباب الحامل لمسبب المرض.
- ٥ - الإنسان المريض.
- ٦ - مياه المجارى.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - أكل الطور المعدى للبروتوزوا مع الطعام.
- ٢ - شرب المياه الملوثة بالبروتوزوا.

خواص الطفيل :

- ١ - يعيش لمدة أسبوعين في البراز عند درجة حرارة الغرفة.

٢ - يعيش فى المياه لمدة ٥ أسابيع عند درجة حرارة الغرفة.

٣ - يموت الطفيل عند درجة حرارة ٥٠°س.

فترة حضانة المرض :

من ٥ أيام ويمكن لعدة شهور.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - يحلل الطفيل الأغشية المخاطية والخلايا بانزيم البرتيوليز، ويسبب تقرحات فى الخلايا.

٢ - شعور بألم فى البطن.

٣ - قلق وإسهال مصحوب بمخاط ودم.

٤ - وجود دمامل فى الكبد والرئة والمخ.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.

٢ - الالتزام بالنواحي الصحية بالابتعاد عن براز الإنسان والكلاب.

٣ - قتل الذباب الذى ينقل الطفيل إلى الطعام.

٤ - الكشف الدورى على الطباخين.

٥ - غسل اليدين بعد الخروج من الحمام.

٦ - علاج الأفراد بالأدوية الخاصة بذلك.

مرض بلانتدياسيز

Balantidiasis

تعريف :

هو طفيل موجود فى الأمعاء الغليظة للإنسان والقروء والخننازير.

سبب العدوى :

بلانتديوم كولى Balantidium Qli.

مصدر العدوى للإنسان :

أكياس البلانتديوم كولى الموجودة فى براز الإنسان والخننازير والقروء.

طريقة نقل العدوى للإنسان :

أكل طعام ملوث وكذلك شرب ماء ملوث ببراز الخننازير أو الإنسان الموجود به مسبب المرض.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - يسبب تقرحاً فى الأمعاء الغليظة.
- ٢ - شعور بالألم فى البطن.
- ٣ - إسهال ومخاط مدمم.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - الكشف الدورى على الطباخين.
- ٣ - قتل الذباب الذى ينقل مسبب المرض.
- ٤ - الابتعاد عن براز الخننازير والأفراد المرضى.
- ٥ - علاج الأفراد بالأدوية المخصصة لذلك.

مرض جياردياسيز

Giardiasis

تعريف :

تعيش جيارديازيس فى الجزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة فى الإنسان وتسبب إسهالاً مزمنًا وتقلصًا فى عضلات البطن وتسبب انتفاخًا وبرازًا مشحمًا وإرهاقًا وتعبًا وفقدان الوزن، والمرض يصيب الأطفال أكثر من الكبار.

سبب المرض :

جياردا لامبليا (جياردا إنتستينالى) *Giardia lamblia*.
وأحيانًا تسمى الجياردا بأسماء الحيوانات التى تصيبها.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - الإنسان والحيوانات المنزلية الأليفة والبرية.
- ٢ - البراز المحتوى على البروتوزوا.

طرق انتقال العدوى للإنسان :

- ١ - عن طريق أكل الكيس المحتوى على البروتوزوا فى الطعام الملوث.
- ٢ - شرب الماء الملوث.
- ٣ - اللمس المباشر من اليد إلى الفم من الإنسان المصاب.

فترة حضانة فى الإنسان :

من ٥ - ٢٥ يومًا أو أطول وفى المتوسط من ٧ - ١٠ أيام.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - إسهال وألم فى البطن.
- ٢ - قىء وغثيان.

٣ - عزل الكيس الموجود به الطفيل من البراز.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - تعريف الإنسان بالمرض وطرق الوقاية منه.

٢ - غسل اليدين جيّدًا بعد التبرز.

٣ - علاج الإنسان بالدواء المناسب (فلاجيل).

٤ - عدم شرب المياه الملوثة.

٥ - عدم أكل الطعام الملوّث.

٦ - الكشف الدورى على الطباخين.

مرض كريبتو سبوريدiosis Cryptosporidiosis

تعريف :

هو مرض يوجد فى الجهاز الهضمى وفى القناة المرارية والقناة التنفسية للإنسان وفى الفقاريات ويسبب أيضًا إسهالًا، والمرض يوجد فى الأطفال فوق سنتين من العمر.

سبب المرض :

كريبتوسبوريديم أو كوكسيديان بروتوزوان
Cryptosporidium – Coccidian orotzoan

مصدر وطرق العدوى بالمرض فى الإنسان :

- ١ - اللمس المباشر لبراز الحيوانات المريضة أو الحاملة للطفيل وكذلك الإنسان المريض.
- ٢ - الطريق غير المباشر وهو أكل الطعام والشراب الملوث ببراز الإنسان أو الحيوان الحامل للمرض.
- ٣ - الطريق الأساسى للعدوى هو الفم من اليد الملوثة بالبراز من الحيوان أو الإنسان.
- ٤ - الإنسان والبقرة والحيوانات الأخرى.

فترة الحضانة فى الإنسان :

من ١ - ٢ يوم بمتوسط.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - الإسهال المائى.

٢ - فقد الشهية.

٣ - قيء وألم فى البطن.

٤ - ارتفاع فى درجة الحرارة.

٥ - غثيان.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية.

٢ - غسل اليدين جيداً بعد التبرز.

٣ - الابتعاد عن لمس براز الحيوان والإنسان.

٤ - اتباع الطرق الصحية.

٥ - غلى الماء أو ترشيحه قبل استعماله.

٦ - عزل المريض وعلاجه تبعاً للأعراض.

٧٥ - تطهير الأدوات الخاصة بالمريض بواسطة ١٠٪ فورمالين أو ٥٪ محلول الأمونيوم.

مرض تريپانوسمومياسيز

Trypanosomiasis

(مرض النوم الأفريقي)

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان والبقر والخنزير وينتقل عن طريق ذبابة تسي تسي.

سبب المرض :

تريپانوسوما جامبيني *T. gambiensi*، تريپانوسوما رودسينسي *T. rhodesiensi*، تريپانوسوما بروسى *T. brucei*.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - عن طريق وسيط وهو ذبابة تسي تسي (يمكن أن توجد العدوى فيها لمدة خمسة شهور).

٢ - دم الإنسان والبقر والخنزير.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - تنقل ذبابة تسي تسي الحاملة للطفيل من الحيوانات المريضة إلى الإنسان أو الحيوانات السليمة.

٢ - نقل العدوى مباشرة عن طريق نقل الدم.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - حمى وصداع.

٢ - كبير حجم الغدد الليمفاوية.

٣ - أنيميا وأديما.

٤ - أعراض عصبية.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الإنسان بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - قتل الذباب بالمبيدات الحشرية.
- ٣ - تشخيص المرض فى الحيوانات وعلاجها.
- ٤ - علاج الأفراد بالانتربول.

مرض ليشمانيا سينز

Leishmaniasis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان والكلاب والقطط والفئران ويسبب أُلماً في الجلد وتقرحاً فيه ونزيفاً في الأمعاء.

سبب المرض :

ليشمانيا جلدية (ليشمانيا تروبيكا *L. tropica*، ليشمانيا نيلوتيكيا *L. nilotica*، ليشمانيا معوية، ليشما دونوفاني (*L. donovani*).

مصدر العدوى للإنسان :

الإنسان والكلاب والقطط والفئران المريضة بالليشمانيا.

طرق نقل العدوى للإنسان :

عن طريق عض ذبابة الرمل للإنسان والحيوان والحاملة للمرض.

فترة الحضانة للمرض في الإنسان :

من شهر إلى خمسة شهور.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - ظهور نقط لون النحاس على الجلد داخل بثرة ثم تتنكرز ثم تغطي بقشرة بنية وتترك تقرحاً تحتها.
- ٢ - التهاب الغدة والتهاب الغدد الليمفاوية.
- ٣ - ارتفاع في درجة الحرارة.
- ٤ - كبر حجم الكبد.
- ٥ - ظهور أنيميا نتيجة نزف دم من الأعضاء الداخلية.

٦ - ظهور قرح فى الأمعاء.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - تعريف الفرد بالمرض وطرق الوقاية منه .

٢ - قتل ذبابة الرمل.

٣ - منع تراكم الزبالة بجوار المنازل.

٤ - تحصين باللقاح الخاص بذلك للإنسان.

٥ - علاج المرضى بالأنتميونى.

توكسوبلازموزيسيز

Toxoplasmosis

تعريف :

هو مرض منتشر فى العالم فى الطيور والثدييات والإنسان والقطط والبقر والكلاب والغنم والخنازير والماعز.

سبب المرض :

بروتوزوا توكسوبلازما جوندى *Toxoplasma gondii*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - الحيوانات المصابة بالمرض مثل البقر والغنم والخنازير والكلاب والقطط.
- ٢ - الإنسان المصاب بالعدوى.
- ٣ - لحوم البقر والغنم والماعز والخنازير المحتوية على البروتوزوا.
- ٤ - لبن الحيوانات.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - أكل الطعام الخام وغير المطهى جيداً والمحتوى على الطور النشط للبروتوزوا.
- ٢ - شرب لبن خام يحتوى على الطفيل.
- ٣ - الذباب ينقل الطفيل ميكانيكياً إلى الأطعمة المكشوفة.
- ٤ - ينتقل المرض عن طريق الأم للجنين.
- ٥ - يمكن نقل المرض عن طريق نقل الدم وهذا يحدث نادراً.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - إجهاض الحوامل.
- ٢ - التهاب المخ للمواليد المصابين.

٣ - وجود ماء بالمخ ويكبر حجمه.

٤ - ارتعاش العضلات.

٥ - التهاب فى العين.

٦ - إسهال وأحياناً مدم.

٧ - ارتفاع درجة الحرارة.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - تعريف الإنسان بالمرض وطرق المقاومة.

٢ - عدم أكل اللحوم من الحيوانات المريضة.

٣ - عدم شرب الحليب الخام من الحيوانات المريضة.

٤ - لا بد من غلى الحليب أو تعقيمه.

٥ - طهى اللحوم جيداً.

٦ - إعدام القطط والكلاب الضالة.

٧ - عزل الحيوانات المريضة وعلاجها.

٨ - الحيوانات الميتة والحاملة للبروتوزوا ويجب اتباع النظم الصحية فى دفنها.

٩ - قتل الذباب والفئران حتى لا تنتقل العدوى إلى مكان آخر.

١٠ - يجب التعاون بين الأطباء البيطريين والبشريين فى الكشف وعلاج هذا المرض.

الفصل الثاني

ب - الديدان Helminths

(أ) الديدان الأسطوانية Nematodes

مرض ترايكنيوزيس

Trichinosis

تعريف :

مرض يأتي عن دخول يرقات أو الطفيل في جسم الإنسان أو الحيوان.

سبب المرض :

ترايكنيلاسبيراليس Trichenellaspinalis.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - لحوم الحيوانات ومنتجاتها مثل حيوان الخنزير.

٢ - الفئران والخنزير والحيوانات البرية والبحرية.

طرق نقل العدوى للإنسان :

أكل لحوم الحيوانات المحتوية على الطفيل.

أعراض المرض في الإنسان :

١ - ألم في البطن والتهاب في جدار الأمعاء.

٢ - حساسية وظهور أوديميا في جفون العين.

٣ - نزيف داخلي في العين.

٤ - الخوف من الضوء بعد ١١ يوماً من العدوى.

طرق وقاية الإنسان من العدوى :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وكيفية مقاومته.
- ٢ - الكشف عن المرض فى اللحوم قبل استخدامها.
- ٣ - عدم أكل اللحوم الخام قبل طهيها جيداً.
- ٤ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم نقل العدوى للجزارين والبيطريين عند ذبح وسلخ الحيوانات المريضة.
- ٥ - تجميد اللحوم عند درجة حرارة ٣٠°س لمدة ٢٠ يوماً مما يدمر الطفيل.
- ٦ - قتل الفئران فى المزارع والمجازر ومحلات بيع اللحوم.
- ٧ - علاج الأفراد تبعاً لظهور الأعراض.

مرض انكلوستوما برازيلينزى

Ancylostoma braziliensi

تعريف :

مرض يصيب الإنسان والكلاب والقطط ويصيب الأطفال أكثر من الكبار.

سبب المرض :

يرقة انكلوستوما برازيلينزى *Larva of ancylostma braziliensi*.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - الإنسان والكلاب والقطط المريضة.

٢ - التربة الرطبة الملوثة ببراز الكلاب والقطط.

طرق نقل العدوى للإنسان :

دخول اليرقة لجلد الإنسان عن طريق التربة الملوثة بالمرض، والأطفال أكثر عرضة للمرض من الكبار.

أعراض المرض فى الإنسان :

١ - ظهور بثرات مكان دخول اليرقة فى جسم الإنسان.

٢ - التهاب فى الأعصاب وخاصة بالليل.

٣ - هرش الجلد.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - علاج الأفراد بالثيوبندازول.

٢ - علاج الطفيليات فى الكلاب والقطط من آن لآخر.

٣ - عدم ذهاب الكلاب والقطط إلى شاطئ البحر أو فى أى مكان يذهب إليه الأطفال.

مرض توكسوكارا كينز

Toxocara Canis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان والكلاب.

سبب المرض :

بيض توكسوكارا كينز Egg of toxocara canis.

مصدر العدوى للإنسان :

التربة الملوثة ببيض الطفيل.

طريقة نقل العدوى للإنسان :

- ١ - الأطفال أكثر عرضة للمرض وذلك عن طريق لعبهم فى الأرض الملوثة ببيض الطفيل من الكلاب المريضة ثم ينتقل من يد الأطفال إلى الفم.
- وكذلك الكبار عن طريق لمسهم المواد القذرة باليد الملوثة بالمرض ثم إلى الفم أيضًا.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - اليرقة تخرج من البيضة فى الأمعاء وتذهب إلى أجزاء الجسم الأخرى.
- ٢ - كرات الدم البيضاء تزداد فى العدد وبخاصة الأيزونوفيل.
- ٣ - كبر حجم الكبد.
- ٤ - ارتفاع درجة الحرارة.
- ٥ - فقد للشهية.
- ٦ - التهاب المفاصل.
- ٧ - انقباض فى حدقة العين.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - علاج الكلاب بالأدوية الخاصة بذلك مثل ببرازين أديبيت.
- ٣ - اتباع الطرق الصحية والبعد عن الحيوانات المريضة.
- ٤ - قتل كلاب الشارع.
- ٥ - علاج الإنسان بالأدوية الخاصة بالطفيل عند الطبيب.

(ب) الديدان الشريطية Cestodes

مرض تنيازيسيز

Taeniasis

تعريف :

مرض يوجد فى أماكن مختلفة من العالم وموجود بأكثرية فى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا ويوجد فى أمعاء الإنسان.

سبب المرض :

١ - تينا ساجيناتا (البقر) Taenia Saginata.

٢ - تينيا سوليم (الخنزير) Taenia Solium.

مصدر العدوى للإنسان :

١ - لحوم الأبقار الموجود بها اليرقات.

٢ - براز الإنسان المحتوى على بيض الطفيل.

٣ - الخنازير الموجود بها الطفيل.

طرق نقل العدوى للإنسان :

١ - أكل لحم البقر الخام أو غير المطهى جيداً والمحتوى على الطور المعدى للطفيل.

٢ - أكل لحم الخنزير الخام أو غير المطهى جيداً أو المحتوى على الطور المعدى للطفيل.

٣ - عن طريق العدوى ببيض تينيا سوليم (الخنزير) الملوثة للطعام أو من اليد بالفم مباشرة من الخنزير الحامل للمرض.

- ٤ - عن طريق الإنسان يعدى نفسه من عدم غسل يديه جيداً بعد التبرز والحامل لمرض تينيا سوليم (الخنزير).
- ٥ - عن طريق تلوث الغذاء ببيض تينيا سوليم (الخنزير) فيأكله الإنسان فيصاب بالمرض.

فترة حضانة المرض فى الإنسان :

٨ - ١٢ أسبوعاً.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - التهاب الأمعاء.
- ٢ - فقدان فى الشهية.
- ٣ - فقدان فى الوزن.
- ٤ - ألم فى البطن.
- ٥ - شعور بالجوع.
- ٦ - التهاب فى الأعصاب.
- ٧ - ظهور الحساسية فى جسم الإنسان.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - لابد من الكشف على اللحوم للتأكد من خلوها من المرض وإعدام الذبيحه الموجود بها العدوى.
- ٣ - إعدام الحيوانات الحية من البقر والخنزير التى يظهر فيها المرض.
- ٤ - الوقاية اللازمة للأفراد عند التعامل مع الحيوانات المريضة بهذا المرض.
- ٥ - غسل اليدين جيداً قبل تناول الغذاء.
- ٦ - علاج الأفراد بالأدوية المناسبة للمرض مثل يوميزان.

مرض دايفيلوبوثرياسيز

Diphyllobothriasis

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان ويوجد الطفيل في الأمعاء ويسبب أنيميا.

سبب العدوى :

دايفيلوبوثريوم لاتم *Diphyllobothrium latum*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - لحوم الأسماك الطازجة الموجود بها الطفيل.
 - ٢ - الكلاب والقطط والخنازير والإنسان لإحتواء برازهم على بيض الطفيل.
- طرق نقل العدوى للإنسان :
- أكل لحوم الأسماك الخام والطازجة أو التي لم تكن مطهية جيداً والمحتوية على الطور المعدى للطفيل.
- أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - ظهور الأنيميا.
 - ٢ - ظهور ألم شديد عند الإنسان إذا انسدت أمعاؤه بالديدان.
 - ٣ - اضطراب في الجهاز الهضمي.
 - ٤ - عدم الإحساس في نهايات الأطراف.
- طرق الوقاية من المرض :
- ١ - معرفة الإنسان بالمرض ووقايته.
 - ٢ - طهي الأسماك جيداً قبل الأكل.
 - ٣ - علاج الأفراد بواسطة أتابرين أو يومازين علاج الكلاب والقطط بالاريكولين أو نيكلوسامين أو كيتاكرين أو براز كوانتيل.
 - ٤ - إعطاء الإنسان أيضاً فيتامين ب ١٢.

مرض إكائنوкокوسيز (مرض هيداتيد) **Echinococcosis (Hydatid disease)**

تعريف :

- ١ - إكائنوкокوس مرض يصيب الكلاب ويوجد الطفيل في أمعاء الكلاب.
- ٢ - هيداتيد توجد في أكلات الأعشاب والإنسان.

سبب المرض :

إكائنوкокوس جرانيولوزس Echinococcus granulosus.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - براز الكلاب الموجود به بيض الطفيل.
- ٢ - يرقة الطفيل (هيداتيد) الموجودة في لحوم الحيوانات، وهذه تعدى الكلاب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - أكل الخضراوات أو شرب الماء الملوث ببيض الطفيل.
- ٢ - خلال لمس براز الكلاب باليد ثم توضع اليد في الفم فينتقل بيض الطفيل إلى الإنسان.
- ٣ - العدوى مباشرة من الكلاب إلى الإنسان وذلك بلحس الكلب للإنسان فينتقل البيض من الكلاب إلى الإنسان وذلك لأن الكلب عنده عادة لحس فتحة الإست الخاصة به وعليها بيض الطفيل الموجود في أمعائه.
- ٤ - نقل بيض الطفيل بواسطة الذباب الذي بدوره ينقله للإنسان.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - وجود هيداتيد في الكبد والرئة ويختلف حجمها من رأس الدبوس وحتى رأس الطفل.

- ٢ - فرط الحساسية عند الإنسان نتيجة انفجار كيس الهيدأوت.
 - ٣ - ظهور أوديميا فى البطن.
- طرق وقاية الإنسان من المرض :
- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
 - ٢ - عدم تغذية الكلاب على لحوم غير مطهية جيداً.
 - ٣ - إبعاد الكلاب عن المجازر.
 - ٤ - إعدام الحيوانات المذبوحة والموجود بها المرض بكثافة.
 - ٥ - قتل كلاب الشارع.
 - ٦ - عمل جراحة للإنسان لإزالة كيس هيداتيد لعدم وجود دواء فعال.

مرض هيمينولوبس

Hymenolepes Infestation

أو مرض الدوراف فى الإنسان " Dwarf tape worm of men " Or

تعريف:

هو مرض موجود فى الأمعاء للإنسان وبخاصة فى الأطفال وأمعاء الفئران والجرذان.

سبب المرض:

هيمينولوبس نانا Hymenolepes nana.

هيمينولوبس ديمينوتا Hymenolepes diminuta.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - براز الإنسان والفئران والجرذان الموجود بهم بيض الطفيل.
- ٢ - الإنسان والفئران والجرذان الحاملون للطفيل.

طرق نقل العدوى للإنسان:

- ١ - أكل البيض مباشرة من اليد إلى الفم.
- ٢ - أكل الغذاء الملوث ببيض الطفيل.
- ٣ - شرب الماء الملوث ببيض الطفيل.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - اضطراب فى الجهاز الهضمي.
- ٢ - ألم فى البطن.
- ٣ - إسهال.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - القضاء على البراغيث.
- ٣ - الحفاظ على الماء من التلوث بالبراز الملوث.
- ٤ - الحفاظ على أكل الإنسان من الفئران.
- ٥ - علاج الأفراد بالدواء الخاص بذلك عند الطبيب.
- ٦ - يجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده.
- ٧ - يجب غسل اليدين بعد التبرز.

(ج) الديدان المفلطحة Trematodes

مرض شيسستوزومس

Schistosomes

تعريف:

مرض يصيب الإنسان والبقرة والخنازير والجاموس والكلاب والجرذان والفئران ويوجد في الأوردة الدموية.

سبب المرض:

شيستز جابونيكم Schistosoma Japonicum.

وشيستزما الفصليّة البقرية Schistosoma bovis.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - القواقع الموجودة بها يرقات الطفيل.
- ٢ - الخنازير والبقرة والجاموس والكلاب والجرذان والفئران.

طرق نقل العدوى للإنسان:

بواسطة دخول الطور المعدى للطفيل عن طريق الجلد.

فترة الحضانة:

من ٤ - ٦ أسابيع.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - نزيف بسيط في الجلد نتيجة دخول الطور في الرئة.
- ٢ - التهاب رئوى نتيجة هجرة الطور المعدى في الرئة.

٣ - التهاب كبدى نتيجة المواد السامة من الطور المعدى.

٤ - إسهال.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.

٢ - رش البراز بمحلول سلفات النحاس.

٣ - رش القواقع بمحلول سلفات النحاس.

٤ - يجب أن تكون المياه المستخدمة للإنسان خالية من الطور المعدى للتفيل.

٥ - علاج الإنسان بالأدوية الخاصة بذلك مثل انتيمونى تارتارىت أو تارتر إمتك أو ميراسيل أو ستيفوفين.

مرض فاشيولياسيز

Fascioliasis

تعريف:

مرض يصيب الإنسان والبقرة والجاموس والغنم والطفيل الكبير النامي يعيش في القناة المرارية، أمّا الطور الصغيرة يعيش في أنسجة الكبد يصحبه تكسير في خلاياه ويسبب تضخمه.

سبب المرض:

١ - فاشيولا جيجانتيكا *Fasciola gigantica*.

٢ - فاشيولا هيبتيكا *Fasciola hepatica*.

مصدر العدوى للإنسان:

١ - البقرة والجاموس والغنم المريض.

٢ - القواقع الموجودة بها الطور المعدي.

طرق نقل العدوى للإنسان:

١ - عن طريق بلع الطور المعدي ميتاثر كاليا ثم تذهب الديدان غير الكاملة النمو إلى الكبد أو عن طريق الدم وتذهب بعض الديدان الصغيرة إلى الكبد.

٢ - عن طريق أكل الخضراوات الملوثة بالطور المعدي.

فترة الحضانة:

حوالي ٨ أسابيع.

أعراض المرض في الإنسان:

١ - آلام في البطن.

٢ - تضخم فى الكبد.

٣ - تليف كبدى.

٤ - وجود دمامل فى أجزاء مختلفة من الجسم.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

١ - تعريف الإنسان بالمرض وطرق الوقاية منه.

٢ - تجنب استعمال براز الحيوانات المريضة.

٣ - قتل القواقع.

٤ - يجب غسل الخضراوات جيداً قبل الأكل.

٥ - علاج الأفراد بالأدوية المناسبة لذلك من الطبيب مثل براسيكونتيل.

٦ - علاج الحيوانات بالأدوية المناسبة لذلك.

مرض هيتروفيس هيتروفيس

Hetrophys Hetrophys

تعريف:

هو مرض يصيب الإنسان ويعيش الطفيل فى الأمعاء لآكلات الأسماك.

سبب المرض:

هيتروفيس هيتروفيس Hetrophys Hetrophys.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - السمك الطازج والموجود به ميتاسر كاليا.
- ٢ - السمك المملح والمخلل الموجود به الطور المعدى.
- ٣ - جميع آكلات الأسماك.

طرق نقل العدوى للإنسان:

عن طريق أكل الأسماك الخام أو غير المطهية جيداً أو الأسماك المملحة أو المخللة الحاملة للطور المعدى للطفيل.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - إسهال مدمم.
- ٢ - آلام فى البطن.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الإنسان بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - عدم أكل الأسماك الخام أو المملحة أو المخللة الموجود بها طور العدوى.
- ٣ - طهى الأسماك جيداً قبل الأكل.

- ٤ - لا تستخدم الأسماك المملحة قبل ١٠ أيام من التمليح.
- ٥ - اتخاذ الاحتياطات الصحية لمياه المجارى.
- ٦ - القضاء على القواقع.
- ٧ - علاج الإنسان بالأدوية المناسبة مثل رابع كلوريد الكربون أو تتراكلوروايثين أو زيت كينوبوديوم.

الباب الخامس

**الأمراض الراكسية التي تنتقل من
الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان**

مرض بوتونيوس

Boutonneuse Fever

(تيفوس مرسليلس، تيفوس القراد الأفريقي - القراد الكيني - تيفوس القراد الهندي).

تعريف :

مرض موجود في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا وآسيا موجود في الإنسان.
والقراد الموجود على كل نوع من الحيوانات مثل الفئران والغنم والماعز الحاملة للركتسيا.

سبب العدوى في الإنسان :

ركتسيا كونوري Reickettsia conori.

مصدر العدوى للإنسان :

القراد الموجود على الكلاب وحيث إن القراد يجب أن يعيش بجوار سكن الإنسان ويتعلق بالكلاب.

طرق نقل العدوى للإنسان :

عن طريق عض القراد للإنسان ونقل العدوى إليه.

أعراض المرض في الإنسان :

- ١ - حمى وارتفاع في درجة الحرارة.
- ٢ - ظهور نقط حمراء في الجلد.
- ٣ - تقرح في الجلد مكان العض مع وجود قشر أسود على الجروح.
- ٤ - التهاب الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العض.

- ٥ - صداع شديد.
- ٦ - آلام في العضلات والأربطة.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الإنسان بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - قتل القراد.
- ٣ - عدم التعرض للقراد.
- ٤ - علاج الأفراد تبعًا لظهور الأعراض.

مرض حمى التيفوس
Flea - Borne Typhus fever
(تيفوس الفئران – حمى التيفوس المستوطن)

تعريف :

هو مرض يصيب الإنسان وبخاصة في فصل الصيف.

سبب المرض :

ركتسيا تيفي (ركتسيا موسيري) Rickettsia Typhi – Rickettsia mooseri.

مصدر العدوى للإنسان :

١ – براغيث الفئران.

٢ – الفئران.

طرق نقل العدوى للإنسان :

عن طريق عض البراغيث للإنسان والتبرز على الجرح أو مكان العض فينتقل المرض من البراز إلى جسم الإنسان بالهرش.

عن طريق أكل الإنسان الطعام ملوثًا ببول الفئران.

فترة حضانة المرض في الإنسان :

من ٦ – ١٤ يومًا.

أعراض المرض في الإنسان :

١ – صداع حاد.

٢ – آلام عامة.

٣ – طفح جلدي.

٤ - التهاب المفاصل.

٥ - كحة وقلق.

٦ - غثيان وقىء.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

١ - تعريف الأفراد بالمرض وطرق الوقاية منه.

٢ - قتل الفئران.

٣ - القضاء على البراغيث.

٤ - حماية الطعام من التلوث ببول الفئران.

٥ - علاج الأفراد تبعا للأعراض المرضية.

مرض حمى الكيو

Q Fever

(نيموركتسيوزس - بلقان انفلونزا كوكسيلوزس - حمى السلخانة)

تعريف :

هو مرض يصيب الأفراد العاملين في المجازر ومصانع الصوف.

سبب المرض :

كوكسيلا بورنيتي *Coxiella burnetii*.

مصدر العدوى للإنسان :

- ١ - البقر والغنم والماعز والحيوانات البرية المريضة.
- ٢ - القراد.
- ٣ - المشيمة للحيوانات المريضة.
- ٤ - السائل المشيمي.
- ٥ - أحشاء الحيوانات المريضة.
- ٦ - أجنة الحيوانات المريضة.
- ٧ - القراب الحامل لمسبب المرض.
- ٨ - منتجات الحيوانات الملوثة بالمرض.
- ٩ - عن طريق اللبن الملوث بمسبب المرض.
- ١٠ - بصاق الإنسان المريض.

طرق نقل العدوى للإنسان :

- ١ - استنشاق الركتسيا عن طريق الأتربة المحملة بها.
- ٢ - لمس ومسك المشيمة والسائل الأمونيومي الموجود بها والموجود بهما المرض.

- ٣ - عن طريق عض القراد الحامل للمرض.
- ٤ - عن طريق شرب اللبن الملوث بالمرض.
- ٥ - عن طريق مسك اللحوم الموجود بها المرض.
- ٦ - عن طريق فحص القراد فيخرج منه المرض ثم يلوث الأتربة التى بالتالى يتم استنشاقها فتصيب الإنسان والحيوان.

فترة حضانة المرض فى الإنسان :

من ١٤ - ٣٠ يوما.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة وغثيان وقىء.
- ٢ - طفح جلدى محمر وألم فى العين.
- ٣ - ظهور بثرات على الجلد ومغطة بقشرة سوداء.
- ٤ - رعشة وعرق وصداع وألم فى العضلات.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الفرد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - غلى الحليب أو تعقيمه.
- ٣ - عدم استنشاق الأتربة.
- ٤ - عدم لمس اللحوم ومنتجاتها الملوثة بالمرض.
- ٥ - إعدام المشيمة والأغشية الخاصة بالأجنة المحرقة.
- ٦ - تحصين ضد المرض باللقاح الخاص بذلك.

مرض ركتسيال بوكس

Rickettsial Pox

تعريف :

مرض يصيب الإنسان وموجود بأمريكا وروسيا وجنوب أفريقيا.

سبب العدوى :

ركتسيال أكارى Rickettsial Acari.

مصدر العدوى للإنسان :

الفئران والجردان والعث (مخلوق صغير جدًا) الموجود على الفئران.

طرق نقل العدوى للإنسان :

عن طريق عض العث (مايت) للإنسان فتنتقل إليه ركتسيال أكارى.

أعراض المرض فى الإنسان :

- ١ - ارتفاع درجة الحرارة ورعشة وعرق.
- ٢ - طفح على الجلد وظهور بثرات ومغطاة بقشرة سوداء.
- ٣ - فترة الحضانة ١٠ - ٢٤ يومًا.
- ٤ - ألم فى العضلات.
- ٥ - هرش.

طرق وقاية الإنسان من المرض :

- ١ - تعريف الأفراد بالمرض والوقاية منه.
- ٢ - قتل الفئران والممايت (Mite).
- ٣ - علاج الإنسان تبعًا لظهور الأعراض المرضية.

الباب السادس

أمراض أخرى

مرض الجرب Mang (Scabies)

تعريف:

هو مرض يصيب الإنسان والحيوان.

سبب المرض:

ساركوبتس Sarcoptes (ويسمى باسم كل حيوان مثل ساركوبتس بقر، غنم.. الخ).

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - الطفيل الموجود في فرش الحيوانات.
- ٢ - كل حيوان يحمل الطفيل مثل البقر والجاموس والغنم والكلاب والماعز والخنازير والجمال وحيوانات حديقة الحيوان.

طرق نقل العدوى للإنسان:

عن طريق الالتصاق الكامل للحيوانات المريضة.

أعراض المرض في الإنسان:

- ١ - الهرش بالليل وظهور الجرب في الجلد.
- ٢ - ظهور حساسية في الجلد وظهور بثرات.
- ٣ - ألم في الجلد.
- ٤ - التهاب الجلد.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - عدم التصاق الإنسان بالحيوان المريض.
- ٢ - علاج الإنسان والحيوان بالأدوية الخاصة بذلك.
- ٣ - رش اللاندين حول الحيوانات.
- ٤ - علاج الحيوان بأيفومك.

مرض مياسيز

Specific Myiasis

تعريف:

هو مرض يصيب الإنسان والحيوان عن طريق غزو يرقة الذباب فى الإنسان للأنسجة ويرقة الطفيل مضطرة للتغذية على الأنسجة.

سبب المرض:

يرقة كو كلومايا هومينيفوراكس Larve of Cochliomyia hominivorax.

مصدر العدوى للإنسان:

- ١ - ذبابة زرقاء وخضراء اللون ولها ثلاثة خطوط غامقة على ظهرها.
- ٢ - يرقة الذبابة.

طرق نقل العدوى للإنسان:

عن طريق دخول يرقة الذبابة فى أنسجة الإنسان فتتغذى عليها، حيث الذبابة تضع البيض بجوار الجرح الموجود على جلد الإنسان ثم يفقس ويخرج منه يرقة التى تدخل أنسجة الجسم عن طريق الجرح وتتغذى عليها.

أعراض المرض فى الإنسان:

- ١ - ألم شديد فى المكان المصاب.
- ٢ - التهاب فى الأعصاب وإحساس شديد بالهرش.
- ٣ - تقرح فى الأرجل.
- ٤ - البرقات تصيب الغضاريف.

طرق وقاية الإنسان من المرض:

- ١ - تعريف الفرد بالمرض وطرق الوقاية منه.
- ٢ - تمنع إلى حد كبير العمليات الجراحية للحيوانات فى فصل الصيف.
- ٣ - تنظيف الجروح ومعالجتها.
- ٤ - قتل الحشرات بالمبيدات الحشرية (دايكلورفوس).

الباب السابع

**أمراض أخرى قد تنتقل
من الحيوان للإنسان**

مرض اعتلال الدماغ الأسفنجي في الفصيلة البقرية

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

مرض جنون البقر

Cows Mad

تعريف:

هو مرض عصبي يصيب الأبقار وغير معروف حتى الآن لأنه لم يعزل ولم يعرف خصائصه وينتقل عن طريق العلف.

مسبب المرض:

يطلق عليه نظرياً البروتين القاتل Prion Protein وهو ليس بكتيريا ولا فيروس (والجسم لا يكون مناعة ضده ولا يتأثر بالأشعة فوق البنفسجية ولا يتأثر بالمطهرات الكيميائية).

وجود مرض الأسكريبي:

يوجد في الأغنام.

الأعراض المرضية لمرض جنون البقر والأسكريبي:

١ - ارتفاع درجة حرارة الأبقار والغنم.

٢ - حساسية شديدة للصوت والحركة.

٣ - ظهور أعراض عصبية.

٤ - تقلص في العضلات.

٥ - تشنج الحيوان ثم الموت.

كيفية انتقال المرض إلى الأبقار:

ينتقل المرض عن طريق التغذية بالأعلاف التي بها بروتين مجترات والموجود بها مسبب المرض الذي يُكون جيلًا جديدًا في الأبقار مخالفًا لما هو موجود بالأغنام.

خصائص مسبب مرض الأسكريبي:

له عدة أنواع مختلفة ليست مدروسة وعندما تتغذى الأبقار على الأعلاف الملوثة بهذا المرض، له القدرة على تغيير تركيبه ويكون جيلًا جديدًا من مسبب مرض جنون البقر وتعتمد قوة المرض على نوع الأسكريبي.

الحيوانات القابلة للعدوى من البقر:

الحيوانات القابلة للعدوى هي صغيرة السن والتي يكون عمرها من ٦ شهور وحتى ثلاث سنوات وكذلك الحيوانات الكبيرة في السن. أما الحيوانات التي تبلغ من العمر ٤ - ٥ سنوات تكون العدوى بها قليلة جدًا.

فترة حضانة المرض:

فترة حضانة المرض غير معروفة وذلك لعدم معرفة متى انتقلت العدوى إلى الأبقار ويقال إنها تصل إلى عدة سنوات وعمومًا تكون ما بين ٤ سنوات إلى ٦ سنوات ويمكن أن تصل إلى ٨ سنوات.

طرق العدوى بالمرض:

- عن طريق الفم (التغذية بالأعلاف الملوثة بهذا المرض من وجود بروتين مجترات بها).

– نادرًا ما تنتقل العدوى عن طريق الأم إلى جنينها.

وجود مسبب المرض في جسم الحيوان:

غالبًا ما يوجد مسبب المرض في أنسجة المخ والحبل الشوكي ويجوز وجوده في الجهاز الليمفاوي والطحال والعضلات.

عزل مسبب المرض من الأنسجة المصابة:

يوجد صعوبة كبيرة في عزل مسبب مرض جنون البقر ولكن يقال بالإمكان عزله أثناء ظهور أعراض المرض وليس أثناء فترة الحضانة.

ظهور المرض:

يظهر المرض بكثرة في الأبقار في فصل الربيع حيث تكون أمراض الأيض الخاصة بالتغذية في قمته وتظهر أعراضه في الحيوانات الصغيرة والكبيرة جدا بكثرة، أما الحيوانات التي تبلغ من العمر ٤ - ٥ سنوات تكون الأعراض بها متوسطة أو قليلة الظهور.

مقاومة مسبب المرض للمطهرات والحرارة:

– مسبب المرض لا تؤثر فيه المطهرات كلية ويفلت منها جزء لا يتأثر بها.

– يقاوم درجة الحرارة حتى ١٣٤° درجة مئوية.

تركيب مسبب المرض:

يقال إنه عبارة عن وحدة بروتين صغيرة جدًا Prion Protein حجمها يصل إلى ١٠ - ١٢ نانو ميكرون أى أصغر من الفيروس الذى يتراوح حجمه ١٨ نانوميكرون. وليس به نوع محدد من الحامض النووى الذى يوجد بكمية ضئيلة جدًا.

انتشار المرض في المخ والحبل الشوكى للبقر وجعله مثل الأسفنجية:

وجد بالكشف عن مسبب المرض بالميكروسكوب الإلكتروني فى المخ والحبل الشوكى للأبقار بأنه يتجمع خارج خلايا المخ والحبل الشوكى ويمنع تكسير أنزيم

البروتيز (وهي خميرة تلتهم البروتين) هذا ما يجعل الإنزيم أو الخميرة آكله البروتين تلتهم بروتين المخ والحبل الشوكي وبخاصة المنطقة الرمادية منهما وتظهر نتيجة لذلك فجوات في سيتوبلازم الخلية وهذا يدل على تكسير المخ والحبل الشوكي وتجعل شكلهما مثل الأسفنجة.

سبب انتقال عدوى المرض وانتشارها:

- استيراد الأبقار الحاملة للمرض.
- استيراد الأعلاف الموجود بها بروتين مجترات وحاملة لمسبب المرض.
- وجود مسبب المرض طبيًا في الأغنام التي تستخدم لحومها في الأعلاف.

البلاد التي ظهر بها المرض:

انجلترا - إيرلندا - عمان - فلوكلاند - سويسرا - فرنسا - الدنمارك - البرتغال - كندا - ألمانيا.

علاقة جنون البقر بالإنسان:

من الأمراض التي تصيب الإنسان مرض الكورو ومرض جاكوب ومرض جريستمان والتي تسبب للإنسان تلقًا في المخ والحبل الشوكي يجعلهما على هيئة أسفنجة مخرمة وهو ما يتشابه مع النتيجة التي تحدث في المخ والحبل الشوكي للأبقار المصابة بمرض جنون البقر.

مما جعل العلماء يشكون في أن هذه الأمراض تنتقل للإنسان نتيجة أكل لحوم الأبقار المصابة بمرض جنون البقر.

ومن هنا يجب التوصية بالبحث عن مسببات الأمراض التي تصيب الإنسان أو لا ثم البحث عن مسبب مرض جنون البقر حتى يمكن الفصل والحكم العلمي السليم في صحة انتقال هذه الأمراض للإنسان وسببها مرض جنون البقر عن طريق تناول الإنسان للحوم البقر المريضة بهذا المرض.

انتقال المرض للإنسان:

يقال إنه ينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل لحوم ومنتجات الأبقار الحاملة لمسبب المرض.

طرق الوقاية من المرض:

- عدم استيراد حيوانات حية أو مذبوحة من المناطق الموجودة بها مسبب المرض.
- عدم استيراد منتجات الحيوانات من المناطق الموبوءة بهذا المرض.
- عدم استيراد أعلاف بروتين مجترات.
- إعدام الحيوانات التي يظهر بها المرض حرقاً.
- عدم إدخال بروتينات المجترات في صناعة الأعلاف.
- عدم تغذية الإنسان أو الحيوان باللبن من الحيوانات المصابة.
- عدم أكل الكبد والكلوة والقلب والرثتين من العجول أكبر من ٦ شهور.
- عدم أكل الغدة الصعرية الموجودة أسفل المخ والأمعاء من الحيوانات أقل من ٦ شهور.

**ملخص عن الأمراض التي تنتقل
من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان
وطرق الوقاية منها**

الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان

الأمراض البكتيرية

مرض السل Tuberculosis

هو مرض مزمن أو حاد يصيب قنوات الجهاز التنفسي وبخاصة الرئة وكذلك بعض أجزاء من أجهزة الجسم مثل الجهاز الليمفاوى والتناسلى والعصبى والهضمى للإنسان وتسببه الجرثومة العصوية لميكروب السل *Mycobacterium tuberculosis* والجرثومة العصوية لميكروب السل البقرى *Mycobacterium bovis* والجرثومة العصوية لميكروب سل الطيور *My cobacterium avium* وتنتقل العدوى للإنسان عن طريق تناول اللبن الخام غير المغلى وتناول اللحوم ومنتجاتها وتناول منتجات الألبان من الحيوانات المريضة وكذلك عن طريق استنشاق الهواء الملوث بإفرازات الحيوانات المصابة ويسبب الميكروب فى حالة السل الرئوى كحة مصحوبة ببصاق صديدي وظهور بصاق مدمم فى الحالات الأولى، ارتفاع درجة حرارة المريض بعد الظهر وفى الليل يظهر على المريض عرق أحياناً وفى الحالات المتقدمة يشعر المريض بألم شديد فى الصدر والتهاب فى الغشاء البلورى وفقدان فى الوزن ويتميز المرض بهدم الأنسجة الطبيعية ويحل محلها درنات، وإذا اخترق ميكروب السل الغشاء المخاطى للأمعاء تظهر أعراضه على جدار الأمعاء وقد يكون أولاً مصاحباً للالتهاب البريتونى، وكذلك سل الجلد يسبب تقرحات فى الجلد مصحوبة بلون أصفر أو بنى للجلد ويوجد تضخم فى الغدد الليمفاوية فى الجزء المصاب.

مرض البروسيلا Brucellosis

يسمى بالحمى المالطية أو حمى البحر المتوسط أو الحمى المتوجة ويسبب المرض ميكروب بروسىلا ميليتنسيس *Brucella melitensis* الموجود فى الفصيلة

الماعزية وميكروب بروسيللا أبورتس *Brucella abortus* والموجود فى الفصيلة البقرية وميكروب بروسيللا سويس *Brucella suis* والموجود فى الفصيلة الخنزيرية. وتنتقل العدوى للإنسان عن طريق شرب الحليب الخام وأكل منتجات الألبان المجهزة من حليب الحيوانات المصابة وكذلك التغذية على لحوم الحيوانات المريضة وأيضاً أكل الخضراوات الخضراء المستخدمة فى السلاطة أو شرب المياه الملوثة بإفرازات الحيوانات المصابة بالمرض، وتنتقل العدوى عن طريق الجلد والأغشية المخاطية بالتلامس المباشر وغير المباشر للحيوانات والأجنة والمشيمة والبول من الحيوانات المصابة بالمرض. وتنتقل العدوى للإنسان أيضاً عن طريق استنشاق الأتربة الملوثة بالميكروب من إفرازات الحيوانات المصابة وكذلك من صوف الغنم وشعر الماعز الحاملة للميكروب ويسبب الميكروب فى الإنسان ارتفاعاً فى درجة الحرارة فى الليل وتنخفض فى النهار والشعور بالتعب والرعشة والصداع والعرق بالليل ويسبب آلاماً فى الظهر والأيدى والأرجل والمفاصل مع ظهور تضخم وتيبس فيها وظهور فقدان الشهية ونقص فى الوزن.

مرض الجمرة الخبيثة

Anthrax

هو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويظهر على هيئة بثرات خبيثة فى الجلد وأحياناً يكون فى الرئة ويسمى مرض فارز الصوف وتسببه الجرثومة العصوية لميكروب الجمرة الخبيثة *Bacillus anthracis* وتنتقل العدوى للإنسان عن طريق التلامس المباشر مع إفرازات المنتجات الحيوانية الملوثة بالميكروب وأيضاً عن طريق استنشاق الميكروب فى الأتربة الموجودة على الصوف أو الشعر أو الجلود الجافة أو البراز الجاف للحيوانات المصابة ويسبب الميكروب فى الإنسان بثرات جلدية خبيثة ويسبب التهاباً شديداً فى القصبة الهوائية والرئتين مع تضخم الغدد الليمفاوية الخاصة بهم وارتفاع فى درجة الحرارة وظهور التهاب شديد فى الأمعاء والمعدة مع ظهور براز مدمم.

مرض الحارث

Actinomycosis

هو مرض مزمن تسببه الجرثومة العصوية لميكروب الحارث Actinomyces bovis وينتقل إلى الإنسان عن طريق الخضراوات الملوثة بلعاب الحيوانات المريضة مسبباً أوراماً حبيبية ملتهبة مع وجود تقيحات ووجود جيوب مملوءة بإفرازات صديدية محتوية على حبيبات (كبريتيه أو وردية) وموجودة في التجويف الفمى وفى الرقبة والوجه والصدر والبطن.

مرض حمى الببغاء (مرض داء الببغاء)

Avian chlamydiosis (parrot fever)

هو مرض يسببه ميكروب حمى الببغاء Chlamydia Psittaci ينتقل إلى الإنسان عن طريق استنشاق مسبب المرض من الدجاج والرومى والبط والطيور البرية مسبباً للإنسان تضخماً فى الكبد والطحال وكذلك قىء وإسهال ثم إمساك وأرق وخمول ذهنى وحمى ورعشة وصداع وكحة جافة وخروج بلغم صديدي وإلتهاب رئوى والخوف من الضوء.

مرض الرعام

Glanders

هو مرض يسببه ميكروب Actinobaccillus mali ينتقل إلى الإنسان عن طريق استنشاق مسبب المرض من الرذاذ المحمل بالميكروب مسبباً للإنسان تضخماً فى الغدد الليمفاوية وشعور بالألم وظهور افرازات صديدية وأحياناً مدممة من الأنف ويصاحب ذلك تقرح فى الحاجز الأنفى. انتشار البثرات والدمامل فى كل أجزاء الجسم.

مرض الحمرة

Animal Erysipelas

هو مرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق لمس الحيوانات المصابة بالميكروب مثل السمك والغنم والدجاج والرومى.. الخ، *Erysipelothrix insidiosa* ويسبب الميكروب فى الإنسان حروقاً شديدة فى الجلد وكذلك ألم وهرش وورم مصاحب بالتهاب جلدى محمر اللون ويصيب عادة الأصابع وظهر وبطن اليد وأيضاً يسبب هيجاناً فى الجلد مع التهاب فى المفاصل وفى الشَّافِ المِبطن للقلب.

مرض رغام القوارض

Melioidosis or Rodent glanders

هو مرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق ملامسة أو استنشاق الأتربة أو المياه الملوثة بإفرازات الدمامل المفتوحة والموجود بها الميكروب فى الحيوان ويسببه ميكروب سودومونس سودومالى *Pseudomonas pseudo malli* ويسبب فى الإنسان التهاباً فى القصبة الهوائية والتهاباً رئوياً وارتفاعاً فى درجة الحرارة مع ظهور تنكز فى بعض الأماكن فى الرئتين والغدد الليمفاوية والجلد والعظم ويظهر فى وسط التنكز والورم الحبيبي مادة صديدية.

مرض لستريوسيز

Listeriosis

هو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق شرب الحليب الخام وأكل اللحوم ومنتجاتها من حيوانات مصابة بالمرض وكذلك عن طريق أكل البيض عندما يشرخ ويدخل فيه الميكروب الموجود فى براز الدجاج الملوث بالميكروب وأيضاً ينتقل عن طريق أكل الخضراوات الملوثة بروت الحيوانات المريضة وأيضاً

عن طريق استنشاق الأتربة الموجود بها الميكروب. ويسببه ميكروب *Listeria monocytogenes* ويسبب فى الإنسان الإلتهاب السحائى وإجهاض النساء الحوامل فى الجزء الثانى من الحمل وظهور تخلف عقلى فى الأطفال ويسبب التهاباً فى القصبة الهوائية وكذلك الرئة وظهور تنكروز فى الكبد وتضخم فى الطحال وظهور طفح على الجلد وبخاصة عند الأشخاص الذين يقومون بتوليد الحيوانات.

مرض الطاعون

Plague

هو مرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق عض البراغيث الحاملة للميكروب من الفئران المصابة وكذلك من استنشاق الأتربة المحملة بالميكروب وتسببه الجرثومة العنوية لميكروب *Yersinia pestis* وتسبب فى الإنسان الطاعون الدبلى وهو يصيب الغدد الليمفاوية ويسبب لها ألماً وتضخماً ويصحب ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة أو يسبب أيضاً الطاعون الرئوى وينتج عنه التهاب فى القصبة الهوائية والرئة وصداع وغثيان وكحة وتنخم وبصاق مدمم أو يسبب كذلك الطاعون التسممى ويسبب للإنسان حمى ونزيف من الأنف وإسهال.

مرض الحمى الناكسة

Endemic Relapsing Fever

هو مرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق عض حشرة القراد الحاملة للميكروب من الحيوانات المصابة مثل الفئران والغنم والماعز ويسببه ميكروب بورليا ريكورينتنس *Borrelia Recurrentis* ويسبب فى الإنسان ارتفاع درجة حرارته تظهر وتختفى فجأة وتظهر رعشة وعرق وكذلك صداع وقىء وألم فى العضلات مع وجود التهاب جلدى.

مرض حمى عضه الفأر Rat bite fever

ينقسم إلى مرضين. مرض سودوكو Sodoku وينتقل إلى الإنسان عن طريق عضه الفئران والحيوانات آكلة العشب الحاملة للميكروب ويسببه ميكروب سبيريليم مينس *Spirillum minus* ويسبب للإنسان ارتفاعاً في درجة الحرارة والتهاب الأنسجة المحيطة بالجروح وألماً في العضلات والغدد الليمفاوية القريبة من الجروح وظهور بثرات حمراء على الأذرع والصدر وكذلك أرتيكاريا.

والمرض الثاني هو حمى هافرهيل Haver hill fever وهو ينتقل إلى الإنسان عن طريق عضه الفئران له وكذلك عن طريق شرب الحليب الملوث بالميكروب ويسببه ميكروب استريت باسيلس موريبيفيكانس *Streptobacillus moribificans* ويسبب للإنسان ارتفاعاً في درجة الحرارة وإحمراراً للعضلات وظهور بقع حمراء في اليدين والأذرع والقدمين والتهاباً في المفاصل وتنكراً وتقرحاً في مكان العدوى مع وجود دمامل تحت الجلد.

مرض ليبتوسبيروسيز Liptospirosis

مرض له عدة أسماء منها مرض ولز أو حمى الطين أو حمى حقول الأرز أو حمى المستنقعات أو حمى الطوفان، وينتقل إلى الإنسان من الحيوان عن طريق شرب الحليب الخام من الحيوانات حاملة الميكروب أو عن طريق لمس الذبيحة الموجود بها الميكروب وأيضاً عن طريق شرب المياه الملوثة ببول الحيوانات المريضة وكذلك عن طريق لمس الأسماك الملوثة بالميكروب ويسبب المرض في الإنسان ميكروب ليبتوسبيروز *Leptospire*، وأعراض المرض في الإنسان: نزيف برتقالي اللون والتهاب سحائي والتهاب كبدي وكلوى والتهاب في المخ ويسبب أنيميا والعمى القمري وإجهاض الحوامل.

مرض حمى الأرانب

Tularemia

مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الملتحمة في العين بواسطة الرذاذ الملوث بالميكروب والأيدى الملوثة نتيجة لمس الحيوانات المريضة وكذلك ينتقل عن طريق شرب المياه الملوثة من الحيوانات الحاملة للميكروب وغير المطهية جيداً وأيضاً عن طريق استنشاق الهواء الملوث برذاذ إفرازات الحيوانات الحاملة للميكروب من صوفها أو بولها أو برازها ويسببه ميكروب فرنسيلا تولارنسيس (*Francisella tularenses*) ويسبب للإنسان بثرات في الأيدى الملتحمة بالعين وتضخم الغدد الليمفاوية القريبة من العين (٦٪ من الحالات تقريباً) وظهور صداع شديد وقيئاً وارتفاعاً في درجة الحرارة مع رعشة وألم في الظهر وفي الأطراف ومع ظهور تسلخات في الجلد.

مرض باستيريلاوسيز

Pasteurellosis

يسمى مرض حمى التيفوس أو حمى النقل أو التسمم الدموي أو كوليرا الدجاج أو زكام الأرانب، وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل طعام أو شرب مياه ملوثة بالميكروب أو عن طريق خرسة أو عض من الحيوانات المريضة. ويسببه ميكروب باستيريلا مالتوسيدا *Pasteurella multocida* أو باستيريلا هيموليتيكا *Pasteurella heamolytica* ويسبب للإنسان التهاباً وورماً وألماً شديداً مكان الجرح أو الخرسة أو العض ويسبب ظهور تقرح في الجروح والتهاباً في القصبة الهوائية والتهاباً رئوياً.

مرض يرسينيوسيز

Yersiniosis

هو مرض يسببه ميكروب يرسينيا السل الكاذب *Yersinia pseudotuberculosis* ميكروب يرسينيا أنتيرو كوليتيكا *Yersinia enterocolitica* وينتقل إلى الإنسان

من الحيوان عن طريق التلامس للميكروب بالملتحمة أو عن طريق التلامس المباشر للحيوانات الحاملة للميكروب ويسبب للإنسان التهاب الغدد الليمفاوية مع انتفاخها وظهور الاستسقاء والتهاب الأمعاء وكبر حجم الكبد وارتفاع درجة الحرارة للمريض والتهاب المفاصل والملتحمة والجلد.

مرض سالمونلوسيز (سالمونيلا)

Salmonellosis

هو مرض يسببه ميكروب سالمونيلا تيفيموريم S. Typhimurium أو ميكروب سالمونيلا انتريتيدس S. enteritidis أو ميكروب سالمونيلا كوليرايسيس S.cholerae وينتقل إلى الإنسان من الحيوان عن طريق أكل لحوم الحيوانات الطازجة والمبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض الملوث بالميكروب وأيضاً عن طريق شرب المياه وأكل الخضراوات الملوثة بالميكروب ويسبب للإنسان غثياً وقيئاً وآلاماً في البطن وإسهالاً وارتفاعاً في درجة الحرارة مع شعوره بالبرودة والارتعاش ويسبب صداعاً وقللاً ودوخة وضعفاً في العضلات وشعوراً بالإجهاد ورائحة البراز مثل رائحة الفرخ ولونه أخضر.

مرض كامبيلوبمتريريوسيز

Campylobacteriosis

مرض يسببه ميكروب كامبيلوبكتريريوجوني Campylobacter jejuni وتنتقل العدوى من الحيوان إلى الإنسان عن طريق أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والخضراوات الملوثة بالميكروب وكذلك عن طريق شرب الماء الملوث ويسبب للإنسان غثياً وقيئاً وإسهالاً وآلاماً في البطن وارتفاعاً في درجة حرارة الجسم.

مرض فيبروبارا هيموليتيك

Vibro para haemolyticus infection

مرض يسببه ميكروب فيبروبارا *Vibro para haemolyticus* وينتقل إلى الإنسان من الحيوان عن طريق الطعام الخام من مصدر بحري مثل الأسماك ومنتجاتها والمحاريات الحاملة للميكروب. ويسبب للإنسان غثيائاً وإسهالاً مائياً وأحياناً يكون مدمماً ويسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم.

مرض ايشريشياكولي

Enteropathogenic E. coli infection

هو مرض يسببه ميكروب ايشريشياكولي *E. coli* وينتقل إلى الإنسان من الحيوان عن طريق التغذية ويسبب للإنسان ارتفاعاً في درجة الحرارة ورعشة وصداعاً وألماً في البطن والعضلات وإسهالاً مائياً.

مرض باسيلس سيرس

Bacillus Cereus gastritis

هو مرض تسببه الجرثومة العصوية لميكروب *Bacillus cereus* وينتقل إلى الإنسان عن طريق التغذية على المنتجات الحيوانية والسجق والمقانيق وأطباق اللحوم في الخبز والملوثة جميعها بالميكروب ويسبب للإنسان غثيائاً وقثيائاً وإسهالاً مائياً وآلاماً في البطن.

مرض الزحار (الديزونتاريا)

Shigellosis

مرض يسببه ميكروب شيجلا فلكنسيري *S. flexneri* أو شيجلا ديزنتاري *S. dysenteriae* أو شيجلا بويدي *S. boydii* وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل

التونة والجمبرى والبقوليات والرومى وشرب الحليب الملوّث بالميكروب ويسبب للإنسان ارتفاعاً في درجة الحرارة وغثياناً وقيئاً وإسهالاً مدمماً ومغصاً ورعشة وصداعاً وشعوراً بالتبول والإجهاد.

مرض المكور العنقودى Staphylococcal intoxication

هو مرض يسببه ميكروب المكور العنقودى أوريوس Staphylococcal aureus وينتقل إلى الإنسان عن طريق التغذية على اللحوم ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها ولحوم الدواجن الملوثة بالميكروب وأيضاً عن طريق شرب الحليب من الحيوانات المريضة أو عن طريق استنشاق الهواء المحمل بالرداذ من الأفراد المرضى بأمراض الجهاز التنفسي، ويسبب للإنسان غثياناً وقيئاً ونزول لعاب وألماً في البطن وإسهالاً مدمماً وشعوراً بالصداع والإجهاد وارتفاعاً في درجة حرارة الجسم. كما يسبب انخفاض ضغط الدم.

مرض بوتيليزم Botulism

مرض يسببه ميكروب كلويستريديم بوتيلينم Clostridium botulinum وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل أمعاء وكبد البقر والمعلبات. الملوثة بالميكروب، يسبب للإنسان غثياناً وقيئاً وألماً في البطن ويسبب قلقاً وازدواج الرؤية وعسراً في البلع.

مرض الأريزونا Arizona infection

هو مرض يسببه ميكروب هينوهاوى A. hinohawii وينتقل للإنسان عن طريق تناول لحوم الدجاج والرومى والقشدة والآيس كريم والكستر المحتوى على البيض

والملوثة جميعها بالميكروب، ويسبب للإنسان ألماً فى البطن وإسهالاً وغثيائاً ورعشة وصداعاً وارتفاعاً فى درجة الحرارة وضعفاً عاماً.

مرض الحمى القرمزية Scarlet fever

هو مرض يسببه ميكروب المكور العنقودى Streptococcus Pyogenes وينتقل إلى الإنسان عن طريق شرب الحليب الخام وأكل الآيس كريم والبيض والكسندر الملوثة جميعها بالميكروب ويسبب للإنسان التهاب الزور واللوزتين وألماً عند البلع وارتفاعاً فى درجة الحرارة وصداعاً وغثيائاً وقيئاً وظهور بقع حمراء على الجلد.

مرض نيوكاسل Newcastle disease

يسببه فيروس نيوكاسل Virus newcastle وينتقل إلى الإنسان عن طريق لمس الطيور المذبوحة والحية والحاملة للميكروب، ويسبب له التهاب القرنية المحيب والغدد ونزيفاً تحت الجلد وأوديميا فى جفون العين ونزيفاً تحت القرنية والتهاب الأوعية الدموية للعين وارتفاع درجة حرارة الجسم مع ظهور رعشة وصداع وتوعك.

مرض نتوء ملكرز Mikers nodules أو مرض عُجِيْزَة ملكرز Mikers warts

هو مرض يسببه فيروس جدري البقر Cow pox ، أو فيروس جدري البقر الكاذب Pseudo-Cow pox ، وينتقل إلى الإنسان عن طريق التلامس المباشر لحلمات البقر المريض وبخاصة إذا وجد فى يد الحلاب أو الإنسان الملامس خدوش أو جروح، ويسبب له إمّا بثرات ثم تكبر وتكون حويصلة وطفحاً جلدياً ثم تتحول إلى صديد ثم قشرات وتترك سطحا معافى وتظهر على يد الحلابين، والبثرة تبدأ صغيرة محاطة بالتهاب جلدى وإحمرار للبشرة ويصحبها ألم وشعور بالهرش وتورم فى الغدد الليمفاوية الإبطية.

الأمراض الفيروسية

مرض الحمى القلاعية

Foot and mouth disease

هو مرض يسببه فيروس الحمى القلاعية Foot and mouth virus وينتقل إلى الإنسان عن طريق شرب الحليب الخام وأكل الزبد والجبن من الحيوانات المريضة أو عن طريق رذاذ إفرازات الغدد اللعابية من الحيوانات المصابة فيصيب مباشرة الغشاء المخاطي لقم الإنسان أو عن طريق مباشر من لمس الخدوش والجروح في الأيدي بالفيروس من الحيوانات المريضة. ويسبب للإنسان ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الفم نتيجة البثرات وشعوراً بالألم شديد في الفم مع جفافه وصعوبة المضغ والبلع مع وجود طفح في الشعيرات الدموية في الغشاء المخاطي بوجنتي الفم.

مرض التهاب الجلد المعدى

Contagious pustular dermatitis

هو مرض يسببه فيروس باستيولار المعدى Virus contagious pustular وينتقل إلى الإنسان عن طريق ملامسة جلد الحيوان المريض فينتقل الفيروس إلى داخل الخدود والجروح الموجودة في الجلد والأغشية المخاطية للإنسان. ويسبب له التهاب الجلد والفم، وظهور طفح عليها كذلك يسبب التهابات وطفحاً على اللثة واللسان والخدود والشففتين. والشفقتان والأرجل تصاب بتقرح وغالباً ما توجد في الأذرع وتحت الكوع والركبة ويكون بثرات مؤلمة مثل حبة العدس وتسبب الهرش إذا ضغط عليها ويسبب ظهور تضخم في الغدد الليمفاوية القريبة من مكان المرض.

مرض الصعار

Rabies

هو مرض يسببه فيروس الصعار ليسا فيروس Lyssa virus وينتقل إلى الإنسان عن طريق عض حيوان مريض للإنسان أو لمس الجروح الموجودة في الجلد وكذلك

الموجودة فى الغشاء المخاطى بالفيروس ، أو عن طريق لمس لعاب الحيوانات المريضة بأيد مجروحة أو عن طريق شرب حليب خام من حيوان مريض ، ويسبب للإنسان صداعاً وإجهاداً وارتفاعاً فى درجة الحرارة وشعوراً بالعصبية والقلق وورماً فى مكان العض وألماً شديداً به وتنفساً بعمق وبصوت انقباضات فى الحجاب الحاجز وينتهى بتوقف مؤقت والمريض يخاف من الماء والهواء ويهز رأسه للخلف بشدة والظهر يتقوس ويسبب شللاً فى الرئ وعدم القدرة على الشرب ووقوف التنفس والقلب .

حمى الكنگو

Crimean- Congo Haemorrhagic (Congo fever)

هو مرض يسببه فيروس كونگو - حمى النزيف Crimean- congo haemorrhagic fever virus وينتقل إلى الإنسان عن طريق عض القراد الحامل للفيروس له أو ينتقل بواسطة فعض القراد باليد فينتقل الفيروس من القراد إلى جلد اليد المجروح أو عن طريق ذبح وسلخ الحيوانات مباشرة فينتقل الفيروس من الحيوانات المصابة إلى جلد الإنسان المجروح والمخربش ويسبب له ارتفاعاً فى درجة الحرارة مع رعشة وصداع وقىء وألم فى الظهر وإسهال واحمرار الرقبة والوجه والملتحمة فى العين. وتظهر فقط حمراء فى الجلد وفى الفم مع ظهور نزيف فى اللثة ومن الغشاء المخاطى بالمعدة ونزول بول مدمم.

مرض الالتهاب الدماغى اليابانى

Japanese Encephalitis

هو مرض يسببه فيروس أربو فيروس B Arbo virus (فلافى فيروس Flavi virus) وينتقل إلى الإنسان عن طريق عض الناموس الحامل للفيروس من البقر والبط والدواجن والخنازير المريضة بالمرض ويسبب له ارتفاعاً فى درجة الحرارة والتهاباً فى الدماغ وصداعاً وإجهاداً.

مرض حمى الوادى المتصدع Rift vally fever

هو مرض يسببه فيروس حمى الوادى المتصدع Rift Valley virus وينتقل إلى الإنسان عن طريق لمس اللحوم الملوثة بالفيروس أو استنشاق الهواء الملوث بالفيروس ويجوز نقل الفيروس عن طريق شرب الحليب الخام من الحيوانات المريضة وأيضاً ينتقل عن طريق عض البعوض الحامل للفيروس. ويسبب للإنسان ارتفاعاً في درجة الحرارة وصداعاً وألماً في الظهر والتهاباً في المخ وهلوسة وفقد مركز الرؤية وظهور الصفراء ونزيفاً حاداً مع تعب في الكبد.

مرض الحمى الصفراء Yellow fever

هو مرض يسببه فيروس فافى فبركس Flavi fibricus virus وينتقل للإنسان عن طريق البعوض الحامل للفيروس له أو عن طريق تلامس الفيروس مباشرة للجلد المجروح أو الخدوش، ويسبب للإنسان ارتفاعاً في درجة الحرارة ومصحوبة برعشة وصداعاً وألماً في الظهر وغثياً وقئاً نتيجة نزيف من المعدة ويكون لونه أسود ويغزو الدم ويصل إلى الكبد والطحال والنخاع العظمى وتظهر الصفراء على المريض.

الأمراض الفطرية

مرض القوباء الحلقية RINGWORM (TINEA)

هو مرض يسببه فطر كيراتينومييسز Keratinomyces أو ميكروسبورم Mi-crosporium أو ترايكوفيتون Trichophyton أو أبيدر موفيتون Epidermophyton وينتقل إلى الإنسان مباشرة من لمس الحيوانات والأدوات الملوثة بالفطر ويسبب له طفحاً جلدياً أحمر ثم بثرات ووسطها قشرة حولها حويصلة أو أكثر وتؤدي العدوى أحياناً إلى الصلع وفي بعض الأحيان تؤدي إلى ظهور تقرح عميق بالجلد.

مرض الفطر العام (شامل الجسم كله) Systemic mycosis

هو مرض يسببه فطر أسبوروتريكس سككنس Sporotichum Schenckii وينتقل إلى الإنسان مباشرة عن طريق لمس الحيوانات المصابة أو الأتربة الموجودة بها الفطر للجروح الموجودة بجسم الإنسان وتسبب له بثرات دائرية طرية متحركة تحت الجلد ويكون لونها قاتماً ثم يسود لونها وتتقرح بعد عدة أيام أو أسابيع ثم تنتشر هذه البثرات على طول الغدد الليمفاوية ثم بعد ذلك تتقرح البثرات وتفرز صديداً.

مرض أسبير جيلوسز Aspergilloses

يسمى مرض الفطر الرئوي أو فطر الشعب الهوائية ويسببه فطر اسبيريجلوس فيوميغاتس Aspergillus fumigatus وينتقل إلى الإنسان عن طريق استنشاق الفطر من التراب أو من الحيوان والطيور الحاملة للمرض أو عن طريق استنشاق الفطر من الحمام بالفم عندما يغذى الفرد الحمام بفمه ويسبب له حساسية وكحة وبصاقاً به صديد مدمم وارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وفقداناً في السمع وهرشاً وأوديميا وآلاماً شديدة في مكان المرض.

مرض هستوبلازموسيز Histoplasmosis

ويسمى مرض دار لنج أو فطر الخلية المبطن للخلايا ويسببه فطر هستوبلازما كابسيوليتم *Histoplasma Capsulatum* وينتقل إلى الإنسان عن طريق استنشاق الفطر من التراب أو الحيوانات المصابة ويسبب له ارتفاعاً في درجة الحرارة والتهاباً رئوياً وكبدياً وتضخماً في الطحال وتقرحاً في الأغشية المخاطية.

مرض كوكسيد يودوميكوسيز Coccidiomycosis

هو مرض يسببه فطر كوكسيد يودوس اميتس *Coccidioides immitis* وينتقل إلى الإنسان من خلال الجلد المجروح عن طريق لمس الحيوانات المريضة أو استنشاق الفطر وبخاصة خلال الفصول الجافة والمتربة والملوثة بالفطر ويسبب له حمى روماتيزمية ورشحاً وكحة وطفحاً جلدياً وظهور دمل على الجلد والتهاباً سحائياً وارتفاعاً في درجة حرارة الجسم ونقصاً في الوزن.

مرض الكانديدياسز Candidiasis

ويسمى مونيلياسز أو كانديدياسز ويسببه فطر كانديدا البيكانس *Candida albicans* ، وينتقل إلى الإنسان عن طريق لمس الإفرازات من الحيوانات المريضة أو الحاملة للفطر ويسبب له ألماً وإحمراراً وتقرحاً في المكان المصاب مع جفاف الأظافر وتشققها وارتفاعاً في ضغط الدم وارتفاعاً في درجة الحرارة والتهاب الغشاء البلوري والبصاق يكون مدمماً وعادة المرض يوجد تحت الإبط وتحت الثديين وفي ثواني البطن في الإنسان.

مرض بلاستوميكوسيز Blastomycosis

هو مرض يسببه فطر بلاستومييسز Blastomyces Dermatitis وينتقل إلى الإنسان عن طريق اللمس المباشر للحيوانات والتربة الملوثة بالفطر أو عن طريق استنشاق الأتربة الملوثة بالفطر ويسبب له احمرار الجلد وبخاصة الوجه والصدر والقدم مع ظهور بثرات في الجلد بها صديد، وارتفاع درجة الحرارة وكحة وألم في الصدر ونقص في الوزن واعتلال في الجسم.

الأمراض الطفيلية

أ - البروتوزا

مرض أميبياسينز

Amaebiasis

هو مرض تسببه بروتوزوا إنتاميباهستوليتيكا *Entamoeba histolytica* وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل الطعام الملوث بالطور المعدى للبروتوزوا وأيضاً عن طريق شرب المياه الملوثة ويسبب له تقرحات في الخلايا وشعوراً بالألم في البطن وقلعاً وإسهالاً به مخاط مدمم، ووجود دمامل في الكبد والرئة والمخ.

مرض بلانتدياسيز

Balantidiasis

هو مرض يسببه طفيل بلانتيديم كولي *Balantidium coli* وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل الطعام ملوث بالطفيل وكذلك شرب الماء ملوثاً ببراز الخنازير أو الإنسان المصاب، ويسبب له تقرحاً في الأمعاء الغليظة وشعوراً بالألم في البطن وإسهالاً ومخاطاً مدمماً.

مرض جياردياسيز

Giardiasis

هو مرض يسببه طفيل جياردا لامبليا *Giardia lamblia* وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل الطعام الملوث بالطفيل وكذلك عن طريق شرب الماء الملوث ويسبب للإنسان إسهالاً وقيئاً وألماً في البطن وغثيائاً.

مرض كريبتوسبورديوسيز

Cryptosporidiosis

مرض يسببه طفيل كريبتوسبورديوم *Cryptosporidium* أو كوكسيديان بروتوزوان *Coccidian protozoan* إلى الإنسان عن طريق اللبس المباشر لبراز الحيوانات المريضة أو الحاملة للطفيل أو عن طريق أكل الطعام الملوث ببراز

الإنسان أو الحيوان الحامل للمرض أو شرب الماء الملوث بالطفيل، ويسبب له الإسهال والقىء وفقدان الشهية وألمًا في البطن وارتفاعًا في درجة الحرارة وغثيًا.

مرض تريبانوسوميايز Trypanosomiasis

يسمى مرض النوم الأفريقي ويسببه طفيل تريبانوسوما جامبينس Trypanosma gambiensi أو تريبانو سوما رودسينسي T. rhodesiensi أو تريبانوسوما بروسى T. brucei ، وينتقل إلى الإنسان عن طريق بعض ذباب تسي تسي الحاملة للطفيل من الحيوانات المريضة ويسبب له حمى وصداعًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية القريبة من الجزء المصاب وأنيميا وأوديما وأعراضًا عصبية.

مرض ليشمانيايز Leishmaniasis

مرض يسببه طفيل ليشمانيا تروبيكا Leishmania tropica أو ليشمانيانيلوتيكا L. nilotica أو ليشمانيا دودنوفاني L. donovani ، وينتقل إلى الإنسان عن طريق عضة ذباب الرمل الحاملة للطفيل من الحيوانات المريضة له، وتسبب للإنسان نقطًا لونها نحاسي على الجلد داخل بثرة ثم تتنكرز ثم تغطي بقشرة بنية وتترك تقرحًا تحتها وتسبب التهابًا في الغدد الليمفاوية وارتفاعًا في درجة الحرارة وكبر حجم الكبد وظهور أنيميا نتيجة نزف دم الأعضاء الداخلية وظهور قرح في الأمعاء.

مرض توكسوبلازمويز Toxoplasmosis

مرض يسببه طفيل توكسوبلازما جوندى Toxoplasma gondi وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل الطعام الخام واللحوم غير المطهية جيدًا والمحتوية على

الطور النشط للطفيل وكذلك عن طريق شرب الحليب الخام المحتوى على الطفيل
ويسبب للإنسان إجهاض الحوامل والتهاب المخ للمواليد المصابين ووجود ماء بالمخ
مع كبر حجمه وارتعاش العضلات والتهاب العين وإسهالاً وأحياناً يكون مدمماً
وارتفاعاً فى درجة الحرارة.

الأمراض الطفيلية

ب - الديدان

١ - الديدان الأسطوانية

مرض ترايكنوسيز

Trichinosis

هو مرض يسببه طفيل ترايكنيلاسبيرالس *Trichinella spiralis* وينتقل للإنسان من أكل لحوم الحيوانات المحتوية على الطفيل ويسبب له ألماً في البطن والتهاباً في جدار الأمعاء وحساسية وظهور أوديما في جفون العين ونزيفاً داخلياً فيها ويسبب أيضاً الخوف من الضوء.

مرض انكلوستوما برازيلينزي

Ancylostoma braziliensi

هو مرض يسببه يرقة انكلوستوما برازيلينزي *Larv of ancylostoma braziliensi* وينتقل عن طريق دخول اليرقة لجلد الإنسان عن طريق التربة الملوثة من الحيوانات المريضة بالمرض ويسبب له ظهور بثرات مكان دخول اليرقة والتهاباً في الأعصاب وبخاصة في الليل وهرشاً في الجلد.

مرض توكسوكارا كينز

Toxo cara canis

هو مرض يسببه بيض توكسوكارا كينز *Egg of toxocara canis* ينتقل للإنسان عن طريق لمسه باليد المواد القذرة الملوثة ببيض الطفيل من الحيوانات المريضة ثم إلى الفم ويسبب له ازدياداً في كرات الدم البيضاء وكبر حجم الكبد وارتفاعاً في درجة الحرارة وفقداناً للشهية والتهاباً المفاصل وانقباضاً في حدقة العين.

٢ - الديان الشريطية

مرض تنيا سيز

Taeniasis

هو مرض يسببه طفيل تنيا ساجيناتا (*Taenia Saginata*) أو طفيل تنيا سوليم (*Taenia Solium*) وينتقل للإنسان عن طريق أكل لحوم الحيوانات الخام وغير المطهية جيداً والمحتوية على الطور المعدى للطفيل أو عن طريق العدوى ببيض تنيا سوليم (*Taenia Solium*) الملوثة للطعام أو من اليد إلى الفم مباشرة من الخنزير الحامل للمرض. وتسبب التهاب الأمعاء وفقدان الشهية والوزن مع ألم في البطن وشعور بالجوع والتهاب في الأعصاب مع ظهور حساسية في الجسم.

مرض دايفيلوبوثر ياسيز

Diphyllobothriasis

هو مرض يسببه طفيل دايفيلوبوثر لاطم *Diphyllobothrium latum* وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل لحوم الأسماك الخام الطازجة التي لم تطه جيداً والمحتوية على الطور المعدى وتسبب له ظهور أنيميا وألم شديداً في الأمعاء عند امتلاكها بالديدان واضطراباً في الجهاز الهضمي وعدم الإحساس في نهاية الأطراف.

مرض إكانيوكوكوسيز ومرض هيداتيد

Echinococcosis and Hydatid disease

هو مرض يسببه طفيل إكانيوكوكوس جرانيولوزس *Echinococcus granulosus* وينتقل للإنسان عن طريق أكل الخضراوات أو شرب الماء الملوثة

ببيض الطفيل أو عن طريق لمس براز الحيوانات المصابة باليد ثم توضع فى الفم فينتقل بيض الطفيل إلى الإنسان ويسبب له وجود هيداتيد فى الكبد والرئة ويختلف حجمها من رأس الدبوس وحتى رأس الطفل، ويسبب له أيضًا ووجود حساسية شديدة نتيجة انفجار كيس الهيدات وظهور أوديميا فى البطن.

مرض هيمينولوبس

Hymenolopes infestaion

ويسمى مرض دوارف فى الإنسان Dwarf tape worm of man ويسببه طفيل هيمينولوبس نانا Hymenolopes nana أو طقيل هيمينولوبس ديمينيووتا Hymenolopes diminuta، وينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل الغذاء وشرب المياه الملوثة جميعها ببيض الطفيل، ويسبب له اضطرابًا فى الجهاز الهضمي وألّا فى البطن وإسهالًا.

الديان المفلطحة

مرض شيستزومس

Schistosmes

هو مرض يسببه طفيل شيستزوما جابونيكم Schistosoma Japonium أو طفيل شيستزوما الفصيلة البقرية Schistosoma bovis وينتقل إلى الإنسان عن طريق دخول الطور المعدى للطفيل في الجلد، ويسبب له نزيفاً بسيطاً تحت الجلد نتيجة دخول الطور المعدى للطفيل ويسبب أيضاً التهاباً رئوياً نتيجة هجرة الطور المعدى في الرئة والتهاباً كبدياً نتيجة المواد السامة من الطور المعدى وإسهالاً.

مرض فاشيولياسيز

Fascioliasis

هو مرض يسببه طفيل فاشيولا جيجانتিকা Fasciola gigantica و فاشيولا هيبتيكا Fasciola Hepatica وينتقل إلى الإنسان عن طريق بلع الطور المعدى الملوث للغذاء ويسبب له آلاماً في البطن وتضخماً في الكبد والقناة المرارية وتليفاً كبدياً وظهور دمامل في أجزاء مختلفة من الجسم.

مرض هيتروفس هيتروفس

Hetrophys Hetrophys

هو مرض يسببه طفيل هيتروفس هيتروفس Hetrophys Hetrophys وينتقل عن طريق أكل الأسماك الخام وغير المطهية جيداً أو الأسماك المملحة أو المخلفة الحاملة للطور المعدى للطفيل ويسبب له إسهالاً مدمماً وآلاماً في البطن.

أمراض أخرى

مرض الجرب Mange (Scabies)

هو مرض يسببه طفيل ساركوبتس *Sarcoptes* وينتقل للإنسان عن طريق الالتصاق الكامل والمباشر للحيوانات المريضة ويسبب له الهرش بالليل وظهور الجرب فى الجلد وبثرات عليه ويسبب له حساسية وألماً والتهاباً.

مرض ميازس Specific Myiasis

هو مرض يسببه يرقة كوكلومايا هومينيفوراكس *Larva of cochliomyia hominivorax* وينتقل إلى الإنسان عن طريق دخول يرقة الذبابة فى أنسجة الإنسان فيتغذى عليها الذباب ويضع البيض بجوار الجرح الموجود على جلد الإنسان ثم يفقس ويخرج منه اليرقة التى تدخل أنسجة الجسم عن طريق الجرح وتتغذى عليها وتسبب له ألماً شديداً فى المكان المصاب والتهاباً فى الأعصاب وإحساساً شديداً بالهرش وتقرحاً فى الأرجل والبرقات تسبب تكسر الغضاريف.

الأمراض الركتسية

مرض حمى بوتونيوس Boutonneuse fever

هو مرض يسببه طفيل ركتسيا كونورى *Richettsia conori* وينتقل للإنسان عن طريق عض القراد الحامل للمرض له ويسبب له أيضًا حمى وارتفاعًا فى درجة الحرارة مع ظهور نقط حمراء فى الجلد وتقرح فيه والتهاب الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العض وصداع شديد وآلام فى العضلات والأربطة.

مرض التيفوس Flea-born typhus fever

هو مرض يسببه ركتسيا تيفى (ركتسيا موسيرى) *Rickettsia (R.Mooseri)* وينتقل إلى الإنسان عن طريق عض البراغيث الحاملة للمرض له أو عن طريق أكل الطعام الملوث ببول القتران المريضة ويسبب له صداعًا حادًا وآلامًا عامة وطفحًا جلديًا والتهابًا فى المفاصل وكحة وقلقلًا وغثيائًا وقيئًا.

مرض حمى الكيو Q fever

هو مرض يسببه كوكسيلا بورنيتى *Coxiella burneti* إلى الإنسان عن طريق استنشاق الركتسيا من طريق الأتربة المحملة لها ولس ومسك المشيمة والسائل الأمونيوسى الموجود بها والموجود بهما المرض أو عن طريق شرب اللبن الملوث بالمرض أو عن طريق مسك اللحوم الموجود بها المرض أو عن طريق عض القراد الحامل للمرض. ويسبب للإنسان ارتفاع فى درجة الحرارة وغثيائًا وقيئًا وطفحًا جلديًا محمرًا وألمًا فى العين وظهور بثرات على الجلد مغطاة بقشرة سوداء ورعشة وعرقًا وصداعًا وألمًا فى العضلات.

مرض ركتسيال بوكس Rickettsial pox

هو مرض يسببه ركتسيال اكارى *Rickettsial acari* وينتقل للإنسان عن طريق
عض العنك (مخلوق صغير جدًا موجود على الفئران المريضة) ويسبب للإنسان
ارتفاعًا في درجة الحرارة ورعشة وعرقًا وطفحًا جلدي وظهور بثرات مغطاة بقشرة
سوداء وألمًا في العضلات وهرش.

**الأمراض المحتملة انتقالها
من الحيوان للإنسان**

مرض إعتلال الدماغ الأسفنجى فى الفصيلة البقرية (جنون البقر)

Bovine Spongiform encephalopathy (B.S.E)

هو مرض سببه غير معروف هل هو بكتيرى أو فيروسى ويطلق عليه نظرياً اسم البروتين القاتل Prion protein ويحتمل أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق أكل اللحوم ومنتجاتها للأبقار الحاملة للمرض والسدى قد يسبب للإنسان خللاً فى الجهاز العصبى وارتجاف الذراعين والرجلين ويفقد الدماغ عمله تدريجياً ويفقد الذاكرة ويضعف الدماغ ويجعله مثل الأسفنجة.

**الوقاية من الأمراض
التي تنتقل من الحيوانات
ومنتجاتها إلى الإنسان**

الوقاية العامة من الأمراض التى تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان

- ١ - التوعية الصحية للأفراد بكل وسائل الإعلام من صحف وبرامج فى الراديو والتلفزيون وكذلك المدارس والمصانع وكل السبل الممكنة فى مجال الأمراض التى تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان وطرق الوقاية منها.
- ٢ - تطبيق قوانين الحجر الصحى لمنع دخول الأمراض التى يحتمل أن تدخل إلى البلاد مع الحيوانات المستوردة من بلاد أخرى.
- ٣ - اكتشاف مصادر العدوى من حاملى الجراثيم بالكشف الطبى الدورى على الأفراد وبخاصة العاملون فى تحضير وبيع الأطعمة ومن لهم علاقة بالغذاء.
- ٤ - الكشف الدورى على الحيوانات للتأكد من خلوها من الأمراض.
- ٥ - عزل الحيوان المصاب بأمراض تنتقل منه ومن منتجاته إلى الإنسان وعلاجها وتطعيم الحيوانات السليمة ضد هذه الأمراض.
- ٦ - التأكد من عدم إصابة الأفراد ذوى العلاقة بأى مرض معدٍ قد ينتقل إلى منتجات الحيوان ومن ثم يسبب العدوى للآخرين وذلك بأن يكون الفرد منهم حاملاً لشهادة صحية مع مراعاة الكشف الدورى على الأفراد ذوى العلاقة ويستبعد المرضى منهم وعلاجهم.
- ٧ - علاج الأفراد بالأدوية المناسبة لكل مرض وتحصينهم ضد الأمراض.
- ٨ - الوقاية اللازمة للأفراد عند التعامل مع الحيوانات المريضة.
- ٩ - اتباع الشروط الصحية فى الغذاء والتغذية.
- ١٠ - عدم استخدام المياه السطحية الملوثة بالميكروبات.
- ١١ - البحث عن مصدر العدوى باتباع تحركات وملابس المريض قبل مدة الحضنة.

- ١٢ - تطهير مياه الشرب وعدم تلوثها بإلقاء الحيوانات الميتة والمريضة بها.
- ١٣ - قتل الحشرات والفئران التي تكون سبباً في نقل الأمراض إلى الإنسان.
- ١٤ - طهي الأطعمة جيداً قبل تناولها.
- ١٥ - تعقيم الحليب أو غليه قبل شربه.
- ١٦ - يجب غلي البيض لمدة لا تقل عن ٦ دقائق.
- ١٧ - إعدام الحيوانات الميثوس من علاجها.
- ١٨ - عدم الاقتراب من الحيوانات المريضة أو منتجاتها.
- ١٩ - حفظ منتجات الحيوانات بالطرق السليمة.
- ٢٠ - تحصين الدواجن والحيوانات باللقاحات الخاصة بكل مرض عند اللزوم.

رقم الإيداع	٢٠٠٠/٣٥٢٧
الترقيم الدولي	ISBN 977-02-5970-5

١/٩٩/٧٦

طبع مطابع دار المعارف (ج . م . ع .)

المراجع

- ١ - الألبان ومنتجاتها ١٩٧٠ محمد يوسف سليم
- ٢ - الفئذاء دواء وداء ١٩٧٥ عبد العزيز شرف
- ٣ - الإنتاج الحيوانى فى مجال الدواء ١٩٧٦ عبد العزيز شرف
- ٤ - الأدوية والقرآن الكريم ١٩٨٤ محمد محمد هاشم

المراجع الأجنبية:

- Bryan, G. L. Diseases Transmitted Food. A Classification and Summary, Center for Disease Control Atlanta GA, 1978.
- Bryan, G. L. Diseases Transmitted Food (A Classification and Summary) 2nd Ed. Atlanta, Georgia, Centers for Disease Control of the USA, 1982. H.H Publ. (CDC) 83 - 8237.
- Center for Disease Control Atlanta, GA, Food Born and Water Horn Disease Out Breaks - Annual Summary 1976 issued October 1977.
- Elmosalami, E. Meat Hygiene and Technology Fact of Vet. Medicine, Cairo University 1996.
- Hans Riemann Food Born Infection and Infocations 1969 Academic Press New York San Francisco London A Subsidiary of Har Court Brace Javonovich, Publishes.
- Howard R. Roberts "Food Safety" 1981 A Wiley Interscience Publication John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto.

- James M. Jay "Modern Food Microbiology" 1992 Chapman and Hall New York - London.
- Siam, M. "Zoonoses" 1995 Fact .of Vet. Medecine, Cairo University.
- West Thoff. D.C. and W.C. Frazier Microbiology 1978 Third Edition, Tata Mc Grow - Hill Publishing Company Limited New Delhi.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة.....	٣
الباب الأول الأمراض البكتيرية	
مرض السل	٦
مرض البروسيلا	١٢
مرض الجمرة الخبيثة	١٨
مرض الحارث	٢٣
مرض حمى البيغاء	٢٥
مرض الرعام	٢٨
مرض الحمرة	٣١
مرض لستريوسيز	٣٥
مرض الطاعون	٣٨
مرض الحمى الناكسة	٤١
مرض حمى عضه الفأر	٤٣
مرض حمى هافهيل	٤٦
مرض لبيتوسبيروسيز	٤٨
مرض حمى الأرانب	٥٢
مرض باستيريلوسيز	٥٤
مرض يرسينيوسيز	٥٦
مرض سلمونلوسيز	٥٨

الموضوع	الصفحة
مرض كامبيلو بكتريوسيز	٦٠
مرض فيبروبارا هيموليتك	٦٢
مرض ايشريشياكولى	٦٤
مرض باسيلس سيرس	٦٦
مرض الزحار (الديزونتاريا)	٦٧
مرض المكور العنقودى	٦٩
مرض بوتيلوليزم	٧١
مرض الأريزونا	٧٣
مرض الحمى القرمزية	٧٥

الباب الثانى الأمراض الفيروسية

مرض نيو كاسل	٧٨
مرض نتوء مركز	٨٠
مرض الحمى القلاعية	٨٢
مرض التهاب الجلد المعدى	٨٤
مرض السعار	٨٦
مرض حمى الكونغو	٨٩
مرض التهاب الدماغى اليابانى	٩١
مرض حمى الوادى المتصدع	٩٣
مرض حمى الصفراء	٩٥

الباب الثالث الأمراض الفطرية

مرض القوباء الحلقيّة	٩٨
مرض الفطر العام	١٠٠
مرض اسبيريجلوسيز	١٠٢
مرض هستوبلازيموس	١٠٤
مرض كوكسيديودوميكوسيز	١٠٦
مرض الكانديدياسيز	١٠٨
مرض بلاستوميكوسيز	١١٠

الباب الرابع الأمراض الطفيلية

الفصل الأول: بروتوزوا

مرض أميبيا زسير	١١٢
مرض بلانتدياسيز	١١٤
مرض جياردياسيز	١١٥
مرض كريبتو سبوريد يوسيز	١١٧
مرض تريبا نوسومياسيز	١١٩
مرض ليشمانياسيز	١٢١
توكسوبلازيموسيز	١٢٣

الفصل الثاني: الديدان الأسطوانية

مرض ترايكيينيوزيسيز	١٢٥
---------------------	-----

الموضوع	الصفحة
مرض انكلوستوما برازيلينزى	١٢٧
مرض توكسو كاراكينز	١٢٨
الديدان الشريطية	
مرض تنيازسيز	١٣٠
مرض دايفيلوبوترياسيز	١٣٢
مرض اكينو كو كوسيز	١٣٣
مرض هيمينولوبس	١٣٥
الديدان المفلطحة	
مرض شيستزومس	١٣٧
مرض فاشيولياسيز	١٣٩
مرض هيتروفس هيتروفس	١٤١

الباب الخامس الأمراض الركتسية

مرض بوتونيوس	١٤٤
مرض حمى التيفوس	١٤٦
مرض حمى الكيو	١٤٨
مرض ركتسيال بوكس	١٥٠

الباب السادس أمراض أخرى

مرض الجرب	١٥٢
مرض مياسيز	١٥٣

الباب السابع أمراض أخرى قد تنتقل إلى الإنسان

١٥٦	مرض اعتلال الدماغ الأسفنجى فى الفصيلة البقرية
	ملخص عن الأمراض
١٦٣	الأمراض البكتيرية
١٧٥	الأمراض الفيروسية
١٧٩	الأمراض الفطرية
١٨٣	الأمراض الطفيلية
١٩٥	أمراض أخرى
٢٠١	الأمراض المحتمل انتقالها من الحيوان للإنسان
	الوقاية العامة من الأمراض
٢٠٤	التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان
٢٠٦	المراجع